

Dermatological Immune Restoration Syndrome in HIV Infected Patients

Charussri Wachirakaphan MD,

Siri Chiewchavit MD.

ABSTRACT :

WACHIRAKAPHAN C, CHIEWCHAVIT S. DERMATOLOGICAL IMMUNE RESTORATION SYNDROME IN HIV INFECTED PATIENTS. THAI J DERMATOL 2007; 23: 102-118.

DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE , FACULTY OF MEDICINE, CHIANG MAI UNIVERSITY, CHIANG MAI, THAILAND.

Dermatological disease are common in HIV infected patients. The diagnosis and treatment of such problems are rapidly changing following HAART. In many developed countries, incidences of some dermatological disease are on the decline while some disease are emerging with unusual manifestation as a result of improved immunity in patients who receive HAART. Signs and symptoms of diseases may differ depending on pathogenic organisms and disease mechanisms involved. At present there are no clear treatment guidelines available and disease treatment depends on experience of individual physicians. The purpose of this review on dermatological immune restoration syndrome was to provide physicians with relevant information necessary for patient care.

Key word : HIV, AID, Immune Restoration Syndrome, IRIS, immune restitution disease, IRD, immune reconstitution phenomenon , Dermatology

บทคัดย่อ :

จรัสศรี Wachirakaphan, สิริ เชี่ยวชาญวิทย์. กลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันทางผิวหนังในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ วารสารโรคผิวหนัง 2550; 23: 102-118.

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรคทางผิวหนังเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเอดส์ และยังมีความก้าวหน้าในด้านการวินิจฉัยและการรักษาที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก โดยเฉพาะตั้งแต่มีการนำยาต้านไวรัสเอดส์มาใช้รักษาผู้ป่วย ในประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่าอุบัติการณ์ของโรคผิวหนังชนิดต่างๆลดลงไปอย่างมากหลังได้รับยา แต่กลับมีรายงานที่พบว่าโรคผิวหนังบางชนิดปรากฏขึ้นมาใหม่โดยมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม อันเป็นผลมาจากระบบภูมิคุ้มกันที่กลับมาทำงานดีขึ้น กลุ่มอาการและอาการแสดงอันเนื่องมาจากการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันดังกล่าวมีการแสดงออกหลายรูปแบบ ขึ้นกับชนิดของเชื้อที่มากระตุ้นและกลไกการเกิด ปัจจุบันการรักษายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ขึ้นกับประสบการณ์ของผู้รักษา จึงเป็นปัญหาทางโรคผิวหนังในผู้ป่วยติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ ที่น่าสนใจ การรวบรวมรายงานอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยและการรักษานี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

คำสำคัญ : เอชไอวี, เอดส์, การฟื้นตัวของภูมิคุ้มกัน, ผิวหนัง

กลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันทางผิวหนังในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (Dermatological Immune Restoration Syndrome in HIV Infected Patients)

ปัญหาทางโรคผิวหนังเป็นปัญหาสำคัญในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เพราะเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์^{1,2} โดยที่อาการและอาการแสดงที่พบในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก่อนได้รับยาด้านไวรัสเอชไอวีมักมีลักษณะที่แตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไป ในปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการรักษาด้วยยาด้านไวรัสเอชไอวี เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและการติดเชื้อฉวยโอกาสลง พบว่ามีผู้ป่วยส่วนหนึ่งหลังจากได้ยาด้านไวรัสเอชไอวีแทนที่จะมีอาการและอาการแสดงทางผิวหนังที่ดีขึ้น กลับมีอาการเลวลง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันในร่างกาย กลุ่มอาการและอาการแสดงดังกล่าวมีการแสดงออกหลายรูปแบบ ขึ้นกับชนิดของเชื้อที่มากระตุ้นและกลไกการเกิด การรักษา尚无แนวทางที่ชัดเจน ขึ้นกับประสบการณ์ของผู้รักษา จึงเป็นปัญหาทางโรคผิวหนังที่น่าสนใจ และรวบรวมรายงานผู้ป่วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

อาการและอาการแสดงทางผิวหนังในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (Dermatologic manifestation in HIV infected patients)

อาการและอาการแสดงทางผิวหนังของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เป็นปัญหาที่สำคัญและพบได้บ่อย โดยมีอาการได้หลายรูปแบบ ซึ่งอาศัยการวินิจฉัยและการรักษาประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยและการ

ศึกษาวิจัย (cohort studies)^{1,2} การลดลงของภูมิคุ้มกันที่เยื่อเมือกและผิวหนัง (mucocutaneous) เป็นอาการแสดงที่พบได้ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในระยะแรก และพบได้บ่อยระหว่างที่ติดเชื้อ อาการและอาการแสดงทางผิวหนังมีหลากหลายรูปแบบ³⁻⁵ ส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อฉวยโอกาสที่พบน้อย, คือดื้อยา (drug resistance)⁶ หรือมีลักษณะอาการและอาการแสดงแตกต่างกับคนภูมิคุ้มกันปกติ (atypical presentation) โรคผิวหนังบางชนิดพบได้บ่อยขึ้นในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เช่น seborrheic dermatitis, pruritus folliculitis และ xerosis นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างการเพิ่มจำนวนของปัญหาทางผิวหนังของผู้ป่วยกับระดับ CD4 ต่ำกว่า 200 cell/mm³ หรือการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดส์⁷

การลดลงของภูมิคุ้มกันในระบบผิวหนัง เกิดเนื่องมาจากการติดเชื้อเอชไอวีเข้าไปจับกับ antigen presenting dendritic cells^{8,9} และเซลล์เหล่านี้จะจับกับ CD4+ T-lymphocyte ทำให้เชื้อเข้าสู่ CD4+ T-lymphocyte และมีการแบ่งตัวของไวรัสเพิ่มสูงขึ้น พร้อมกันกับการลดลงของจำนวน CD4+ T-lymphocyte ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง นอกจากการลดลงของ CD4 T-lymphocyte แล้ว T-helper cells ซึ่งมี 2 ชนิดคือ T helper-1 (Th-1) และ T helper-2 (Th-2) ก็มีบทบาทสำคัญในการติดเชื้อเอชไอวี^{10,11} โดย Th-1 ซึ่งปกติจะมีหน้าที่หลักในการกำจัดเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกาย โดยทำหน้าที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางเม็ดเลือด (cellular immunity) และ Th-2 ซึ่งทำงานเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทาง antibody (humoral immunity) เมื่อติดเชื้อเอชไอวีจะทำให้มีการลดลงของภูมิคุ้มกันและ

เปลี่ยนจาก Th1 ซึ่งทำงานเป็นหลัก มาเป็น Th-2 ทำงานเป็นหลัก และลดการทำงานของ Th-1 ด้วย¹¹

อาการและอาการแสดงของผิวหนังบางชนิดมีสาเหตุมาจากการทำงานของ Th2 ซึ่งมีผลกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของหลอดเลือด (vasoproliferation) และส่งผลให้เกิด Kaposi's sarcoma ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ติดเชื้อไวรัส Herpes ชนิดที่ 8 (HHV-8) ในทำนองเดียวกัน Th-2 สามารถสร้าง cytokines กระตุ้นการสร้างเส้นเลือด (angiogenesis) ทำให้เกิดโรค angiomatosis ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ติดเชื้อ *Bartonella spp.*⁹ สำหรับ eosinophilic folliculitis เกิดจากเชื้อโรค เช่น *Pityrosporum spp.*, *Demodex folliculorum*, *Corynebacterium spp.* และ *Staphylococci spp.* ทำหน้าที่เป็น antigen กระตุ้นการทำงานของ Th-2 ทำให้หลั่งสาร interleukin-4 (IL-4) ส่งผลให้ระดับ IgE เพิ่มสูงขึ้นและเกิด adhesion molecules ที่เซลล์ผนังหลอดเลือด ดึงดูด eosinophil ให้มารวมตัวกัน (eosinophil migration) นอกจากนั้น Th-2 ยังหลั่ง interleukin-5 (IL-5) ซึ่งเพิ่ม eosinophilia survival¹²

ผลของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี (The effects of highly active antiretroviral therapy)

ในปัจจุบันยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นการรักษาหลักที่สำคัญในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี โดยสามารถลดอุบัติการณ์การติดเชื้อฉวยโอกาส และอัตราการเสียชีวิต⁽¹³⁻¹⁸⁾ ยาต้านไวรัสเอชไอวีมีผลทำให้จำนวนเชื้อไวรัสเอชไอวี (viral load) ลดลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถตรวจพบได้ (undetectable level) และเพิ่มจำนวน naïve , memory CD4 และ CD8 lymphocytes โดยช่วงแรกเป็นการฟื้นตัวของ Th-1 ทำให้เกิดการผิดปกติของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน (immune

dysregulation) มีผลให้ภาวะบางอย่างดีขึ้นหรือเลวลงได้ หลังจากนั้นถ้ายาด้านไวรัสเอชไอวีสามารถเพิ่มระดับ memory CD4 T-lymphocyte และลดจำนวนเชื้อไวรัสเอชไอวีได้อย่างต่อเนื่อง¹⁹ จะเป็นตัวบ่งบอกภาวะการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกัน และใช้ประเมินผลของการรักษาด้วยยาด้านไวรัสเอชไอวี สัดส่วนของระดับ naïve/memory CD4 cell ซึ่งสะท้อนถึงการทำงานของ lymphocyte และสัมพันธ์โดยตรงกับระดับ absolute CD4 cell, การตอบสนองต่อ antigen และ การลดลงของเชื้อไวรัสเอชไอวีในร่างกายผู้ป่วย²⁰

อาการและอาการแสดงทางผิวหนังของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์หลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี มักมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถทำให้โรคผิวหนังบางโรคตอบสนองต่อการรักษามากขึ้น และยังสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดโรคผิวหนังบางโรคได้ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อฉวยโอกาส⁹

ในส่วน of โรคที่ไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อ (noninfectious disease) ได้แก่ Seborrheic dermatitis เป็นโรคทางผิวหนังที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี เชื่อว่า ยีสต์ (lipophilic yeast, *Malassezia spp*) เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอักเสบขึ้นและตอบสนองไม่ดีต่อการรักษาปกติ หลังผู้ป่วยได้รับยาด้านไวรัสเอชไอวีพบว่า การตอบสนองต่อการรักษาแบบคนปกติดีขึ้น⁹ โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอาการและการตอบสนองต่อยาที่ดีขึ้นหลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี²¹ Eosinophilic folliculitis มักพบในผู้ป่วยที่มีระดับ CD4 lymphocyte ต่ำกว่า 200 cells/mm³ เชื่อว่าเกิดจากเชื้อ เช่น ยีสต์, แบคทีเรีย หรือไร (mite) มีลักษณะเป็นตุ่มคัน (itchy papules) ส่วนใหญ่เกิดบริเวณลำตัว

ส่วนบนและใบหน้า ลักษณะทางพยาธิสภาพพบมีกลุ่มของ eosinophils บริเวณรากผม หลังผู้ป่วยได้รับยาด้านไวรัสเอชไอวีพบว่าอุบัติการณ์ของ

eosinophilic folliculitis ลดลง ผื่นแพ้ยา (drug eruption) มีรายงานว่าอาการแสดงดีขึ้นหลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี⁵

สำหรับภาวะติดเชื้อ (infectious disease) ได้แก่ โรคติดเชื้อ *Human papilloma virus* (HPV) เช่น หูดที่มือและ condyloma acuminata, โรคตุ่มใส, งูสวัด, ภูมิขนอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (bacterial folliculitis), หิดชนิด crusted scabies⁹, oral hairy leukoplakia¹¹ และ molluscum contagiosum.^{14,26,27} พบว่าอาการและการตอบสนองต่อการรักษาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังได้รับยาด้านไวรัสเอชไอวี^{9,11,22-23} นอกจากนี้พบว่ามีโรค Kaposi's sarcoma ตอบสนองดีต่อการรักษาด้วยยาด้านไวรัสเอชไอวี^{5,9,14,24,25}

กลุ่มอาการและอาการแสดงทางผิวหนังจากการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกัน (Dermatological immune restoration syndrome)

หลังจากได้รับการรักษาด้วยยาด้านไวรัสเอชไอวี มีผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีบางราย เกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงเนื่องจากการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกัน (immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS), immune restoration หรือ immune restitution disease (IRD) หรือ immune reconstitution phenomenon)²⁸ ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกาย เป็นผลจากการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็ว มักพบในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรงก่อนการรักษา⁵ กลุ่มอาการนี้พบได้หลายรูปแบบ รวมทั้งความผิดปกติทางผิวหนัง^{5,9,22,29-34}

ในปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอนของกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันทางในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี แต่ส่วนใหญ่มีปัจจัยสำคัญคือ

1. ตัวกระตุ้นภายนอก เช่น แบคทีเรีย, ไวรัส หรือ เชื้อรา

2. ภาวะทางคลินิก ที่สามารถบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพที่แสดงได้อย่างชัดเจน หรือ ค่าที่สามารถวัดได้เพื่อบ่งบอกถึงภาวะภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย เช่น จำนวนไวรัส (viral load)

3. ต้องไม่มีสาเหตุอื่นที่สามารถอธิบายอาการที่แย่งได้ เช่น เชื้อไวรัสค็อกซา, การรับประทานยาไม่สม่ำเสมอหรือไม่ถูกต้อง และผลข้างเคียงของยา²⁸

กลไกการเกิด (Mechanism)

เนื่องจากผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีทำให้จำนวนไวรัสเอชไอวีลดลงอย่างรวดเร็ว และมีการเพิ่มขึ้นของระดับ CD4 cells ในกระแสเลือด ในช่วงแรกเป็นการเพิ่มของ T cell lymphocyte แบบ memory cell ซึ่งกระจายตัว (redistribution) มาจาก lymphoid tissue³⁵ กลุ่มเซลล์ดังกล่าวจะมีอายุสั้นและอยู่ในกระแสเลือดได้ไม่นาน เมื่อยาต้านไวรัสเอชไอวีเกิดการแบ่งตัวของไวรัสเอชไอวีได้ต่อเนื่อง จะมีการเพิ่มขึ้นของ naïve lymphocytes ซึ่งจะสะท้อนการฟื้นตัวของการทำงานที่ต่อม thymus นอกจากมีการเพิ่มจำนวนของ T lymphocyte แล้ว ยาต้านไวรัสเอชไอวียังทำให้การทำงานของ lymphocyte ดีขึ้นด้วย ดูได้จาก การตอบสนองทั้งแบบ cellular และ humoral ต่อเชื้อต่างๆ³⁶⁻³⁸ โดยในสี่สัปดาห์แรกหลังได้ยาต้านไวรัสเอชไอวีจะพบการตอบสนองแบบ delayed type hypersensitivity ได้³⁹ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วทั้งในจำนวนและคุณภาพหน้าที่ของ CD4 T lymphocyte พบมีความสัมพันธ์กับการเกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกัน^{35,40}

อย่างไรก็ตามกลไกการเกิดยังไม่แน่นอนและมีหลายรูปแบบ อาการและอาการแสดงมักเกิดใน 3 เดือนแรกหลังได้ยาต้านไวรัสเอชไอวี สะท้อนการตอบสนองของภูมิคุ้มกันเชื้อซึ่งอาจมีชีวิตหรือตายแล้วที่เหลืออยู่ในร่างกาย⁴⁰ ตัวกระตุ้นอาจเป็นเชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส, *Mycobacterium spp* หรือเชื้อรา ที่พบเป็นสาเหตุบ่อย ได้แก่ *Cryptococcus neoformans*, herpesviruses, hepatitis B และ C virus, และ JC virus หรือ ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เช่น sarcoid และ autoimmune disease สามารถพบได้แต่ไม่บ่อย

กลไกการเกิดกลุ่มอาการต่างๆ จะขึ้นกับเชื้อที่กระตุ้น เช่น เชื้อ Cytomegalovirus จะสัมพันธ์กับการเกิด CMV-specific CD8+ T-lymphocytes ทำให้มีระดับ soluble CD30 ซึ่งเป็นตัวแสดงถึง Th-2 cytokine สูงในกระแสเลือด และเกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการต่างๆ ของเชื้อ CMV ส่วนยีนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันทางจากเชื้อ CMV คือ major histocompatibility complex (MHC) genes (HLA-A2, -B44, -DR4) และเกี่ยวกับ allele 1 ใน 3'untranslated region ของ IL12B gene⁴¹ สำหรับการเกิดกลุ่มอาการต่างๆ ของเชื้อ herpes zoster virus จะเกี่ยวกับการตอบสนองของ CD8 T-lymphocyte และ cytokine gene polymorphism ส่วนกลุ่มอาการการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันทางของ herpes simplex virus กลไกการเกิดยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจน จากผลพยาธิสภาพพบ plasma cells และ eosinophils ในบริเวณที่อักเสบ ซึ่ง

อาจบ่งชี้การทำงานของภูมิคุ้มกันแบบ Th-2 เด่น นอกจากนั้นผู้ป่วยที่มีอาการจากเชื้อ HSV ยังพบ MHC haplotype และ HLA class I allele B72^{34,41,42} ส่วนกลุ่มอาการจากเชื้อ *mycobacterium spp* จะเกี่ยวกับการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันแบบ delayed-type hypersensitivity (DTH) และการเพิ่มของ lymphocyte (lymphoproliferative responses) พบกลไกดังกล่าว เกิดได้จากเชื้อ *M. tuberculosis*, *M. avium* หรือ *M. xenopi* โดยผู้ป่วยบางรายมีกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันที่ระดับ CD4 ก่อนได้ยาด้านไวรัสเชไอวี > 600 cell/mm³ ซึ่งถือว่าไม่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันหลังได้ยาด้านไวรัสเชไอวีถ้าเฉพาะระดับ CD4+ T-lymphocyte ทำให้เชื่อว่าเกิดอาการต่างๆของ MAC เกิดจากการฟื้นตัวของ DTH และสาร cytokine ต่างๆ โดยพบการสร้าง TNF α ลดลงจาก monocyte ทำให้เชื้อเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มการสร้าง IL-6 จาก IL6 gene ที่ตำแหน่ง allele 1 ที่ *TNFA-308* และ G allele ที่ position -174 ทำให้เกิดการอักเสบ^{41,42} Foudraine และคณะได้รายงานว่าการเกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันจากเชื้อ MAC หลังได้ยาด้านไวรัสเชไอวี อาจจะเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของ lymphoid ที่ตอบสนองต่อเชื้อร่วมด้วย⁴³ ส่วนกลไกการเกิดอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันของ Kaposi's sarcoma เป็นผลมาจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน (immunopathological response) ต่อเชื้อ human herpes virus-8^{42,43} โดยผ่าน Th-1 cytokine เช่น interferon γ , tumor necrosis factor α และ interleukin-1 (IL-1) รวมถึงสารที่หลังแบบ paracrine และ autocrine จาก

HHV-8 lytic gene expression เช่น viral IL-6 homologue และ a viral G protein-coupled receptor ซึ่งส่งเสริม angiolympthoproliferation และ tumorigenesis

อย่างไรก็ตามกลไกทั้งหมดนี้ไม่สามารถอธิบายกลุ่มอาการที่เกิดจากเชื้อบางชนิดได้ ดังนั้นคงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป²⁸

อาการและอาการแสดง

อาการและอาการแสดงทางผิวหนังแต่ละโรคจะปรากฏขึ้นเมื่อระดับ CD4 ลดลงถึงระดับหนึ่งภายหลังจากการติดเชื้อเชไอวี และจะปรากฏอีกครั้งที่ระดับ CD4 เพิ่มขึ้นหลังได้ยาด้านไวรัสเชไอวี กลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันทางผิวหนังนี้ มีรายงานในผู้ป่วยติดเชื้อเชไอวีได้หลายโรค เช่น โรคงูสวัด (herpes zoster)²⁹⁻³¹, โรคริมฝีปาก (mucocutaneous herpes)^{32,33}, eosinophilic folliculitis^{11,22} และโรคเกิดจากเชื้อ *mycobacterium spp*³⁴

Varicella Zoster Virus (VZV)

ในผู้ป่วยติดเชื้อเชไอวี/เอดส์จะพบโรคงูสวัดเกิดมากขึ้น เมื่อมีระดับ CD4 200 - 500 cells/mm³⁴ และจะปรากฏอีกครั้งหลังได้รับยาด้านไวรัสเชไอวีและระดับ CD4 กลับสูงขึ้นมาสู่ระดับนี้^{5,9,11,22,29-31,40,43,44} อัตราการเกิดอาการของการติดเชื้อ VZV มีจำนวนมากขึ้นหลังได้ยาด้านไวรัสเชไอวี โดยส่วนมากมักเกิดหลังได้รับยา 4 เดือนแต่บางรายมีอาการหลังได้ยานานถึง 1 ปี^{30,32} อาการมักพบเป็นงูสวัดตามแนวเส้นประสาทผิวหนัง (dermatome zoster) หรืออาจพบ zoster sine zoster คือมีอาการเจ็บบริเวณรอยแผลเป็นงูสวัดซึ่งพบได้แต่ไม่บ่อย³³ การศึกษาของ Maetinez

และคณะ³² พบความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์ CD8 lymphocyte หนึ่งเดือนหลังเริ่มการรักษากับการเกิดโรคผิวหนังในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันต้านทานจากเชื้อ VZV จะตอบสนองดีต่อยา acyclovir ขนาดต่ำหรือยา famciclovir^{30,32,33,40}

Herpes Simplex Virus (HSV)

รายงานจากการศึกษาสังเกตพบว่า กลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันต้านทานจากเชื้อ HSV จะมีลักษณะคล้ายการติดเชื้อเริ่มที่เยื่อและผิวหนัง (mucocutaneous herpes) พบเกิดขึ้นได้บ่อยและมีอาการรุนแรงโดยบริเวณที่พบคือ รอบปาก, รอบรูทวาร หรือที่ penis³³ ผู้ป่วยบางรายมีอาการ acute myelopathy เกิดร่วมด้วยกับรอยโรคที่ผิวหนัง ส่วนใหญ่เกิดหลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี 2-6 เดือน ผู้ป่วยมักเคยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวมาก่อนโดยมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้ (subclinical infection)^{33,34,40,43} รอยโรคที่ผิวหนังมักตอบสนองดีต่อยา acyclovir นอกจากนี้ยังมีรายงานการเกิดแผลเรื้อรังที่ penis ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันจากเชื้อ HSV ในผู้ป่วยชาวแอฟริกาผิวดำ ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดมี gene HLA-B72, -Cw0202 และ DRB4 ซึ่งบ่งบอกว่าอาจมี genetic susceptibility มาเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะนี้³⁴

Mycobacterium spp

การเกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันต้านทานจากเชื้อ *Mycobacterium avium complex* (MAC) มีรายงานครั้งแรกในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยา zidovudine สนับสนุนว่าการฟื้นคืนของภูมิคุ้มกันสามารถก่อให้เกิดพยาธิสภาพได้

(immunopathology)^{42,45} อาการและอาการแสดงมักเป็นแบบเฉพาะที่มากกว่าการแพร่กระจาย โดยเชื่อว่าการอักเสบที่สำคัญเกี่ยวข้องกับ cutaneous delayed - type hypersensitivity (DTH) ซึ่งแตกต่างกับอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อ MAC ก่อนได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี ซึ่งผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำและไม่มีภาวะ DTH มักทำให้เกิดอาการแบบแพร่กระจายมากกว่าแบบเฉพาะที่⁴⁶ กลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันต้านทานจากเชื้อ MAC มักมาด้วยอาการไข้, รอยโรคที่ปอด, ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ และก้อนที่มีอาการเจ็บและอักเสบที่ผิวหนัง^{34,47-58} บางรายอาจมีลักษณะเป็นหนอง (suppuration) จากผลขึ้นเนื้อของรอยโรคที่ผิวหนังและต่อมน้ำเหลือง พบการอักเสบแบบ granuloma (granulomatous inflammatory response) การเพาะเชื้อขึ้นเป็น MAC มักได้จากรอยโรคที่ผิวหนังหรือต่อมน้ำเหลืองแต่ไม่ได้จากเลือด^{34,48,51} การอักเสบแบบ granulomatous inflammation นี้ อาจก่อให้เกิดการสร้าง 1,25(OH)2 vitamin D มากขึ้นทำให้เกิดภาวะ hypercalcemia ได้⁴⁰ นอกจากนี้ยังมีรายงานพบอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันต้านทานแบบกล้ำเนื้ออักเสบเป็นหนอง (pyomyositis) ได้⁵⁹ กลุ่มอาการต่างๆเหล่านี้มักเกิดหลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวีประมาณ 3 เดือนแรก มักพบในผู้ป่วยที่มีระดับ CD4 ก่อนได้รับยาด้านไวรัสเอชไอวีน้อยกว่า 50-100 cell/mm³⁹

เชื้อ nontuberculous mycobacterium spp (NTM) ได้แก่ *Mycobacterium scrofulaceum*, *Mycobacterium kansasii* และ *Mycobacterium simiae* มีรายงานว่าก่อให้เกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันต้านทานได้ มีรายงานในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี

และมีระดับ $CD4 < 100 \text{ cell/mm}^3$ ก่อนได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี พบมีอาการไข้, หายใจหอบเหนื่อย, ปวดท้อง, subcutaneous nodules หรือต่อมน้ำเหลืองอักเสบเป็นหนอง (suppurative lymphadenitis) กลุ่มอาการนี้เกิดหลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวีประมาณ 5 สัปดาห์ และตอบสนองอย่างช้าๆ ต่อการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อ (anti-NTM therapy) โดยพิจารณาใช้ corticosteroid ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต⁶⁰ พบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีผู้ใหญ่หนึ่งรายที่ก่อนได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี มีรอยโรคแบบ painful subcutaneous nodules และบาง nodules แดกเป็นแผล กระจายทั่วทั้งตัวเพาะเชื้อขึ้น *Mycobacterium marinum* และหลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี 10 วันเกิดรอยโรคเช่นเดียวกับก่อนได้ยารื้ออีก แต่ครั้งหลังเพาะเชื้อไม่ขึ้น⁵⁷

ส่วนเชื้อ *Mycobacterium tuberculosis* จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ (cellular mediated immune) ที่กำลังฟื้นตัวหลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี แล้วเกิดเป็นกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันได้หลายแบบ⁶¹⁻⁶⁸ กลไกการเกิดการฟื้นตัวของ cutaneous DTH ต่อเชื้อวัณโรค^{61,66} มักมีอาการภายใน 2 เดือนหลังเริ่มยาด้านไวรัสเอชไอวี อาการที่เกิดขึ้นมากในช่วง 2-3 อาทิตย์แรกหลังได้ยา อาการที่พบบ่อยคือ ไข้, ต่อมน้ำเหลืองโตทั้งในปอดและที่ลำคอ อาจพบรอยโรคที่ผิวหนังได้ไม่บ่อย^{34,62} นอกจากนี้ในผู้ป่วยเด็กยังพบต่อมน้ำเหลืองอักเสบจากเชื้อ Bacille Calmette-Guerin (BCG) กระตุ้นการตอบสนองแบบ DTH ต่อเชื้อวัณโรค⁶⁹ ผลพยาธิสภาพพบลักษณะเฉพาะของการตอบสนองแบบ DTH คือ granulomatous inflammation และ tissue necrosis³⁸

ส่วนเชื้อ *Mycobacterium leprae* มีรายงานพบกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันแบบ borderline tuberculoid leprosy เกิดหลังผู้ป่วยได้รับยาด้านเอชไอวี⁷⁰ และมีรายงานผู้ป่วยสองราย ที่มีอาการผื่นที่เข้าได้กับ leprosy reversal reaction และมีเส้นประสาทโต ร่วมกับ ผลบวกของ PCR สำหรับ *Mycobacterium leprae* และผลลบของ PCR ต่อ *Mycobacterium spp* อื่น พยาธิสภาพของรอยโรคผิวหนังพบลักษณะ granulomatous inflammation อาจมี AFB พบหรือไม่พบเชื้อก็ได้ ข้อสำคัญคือต้องตรวจสอบหาการติดเชื้อของ *Mycobacterium spp* อื่นที่อาจพบติดเชื้อร่วมกันได้ (coinfection) ผื่นที่เกิดขึ้นจะตอบสนองดีมากต่อยาด้านโรคเรื้อน⁷¹

Histoplasma capsulatum

กลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันจากเชื้อ *Histoplasma capsulatum* พบได้ไม่บ่อย มีรายงานในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีระดับ $CD4 < 100 \text{ cell/mm}^3$ หลังได้ยาหนึ่งสัปดาห์ พบผื่นแบบ papulo-pustular กระจายทั่วตัวและพบลักษณะ diffuse reticulo-nodular pulmonary infiltrates ใน chest X-ray ผลเพาะเชื้อจากรอยโรคในปอดและผิวหนังขึ้นเป็น *H. capsulatum* ผู้ป่วยได้รับยา amphotericin B และ itraconazole หลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวีนาน 10 เดือน ผู้ป่วยมีต่อมน้ำเหลืองโตที่คอ ขณะนั้นระดับ $CD4$ เท่ากับ 56 cells/mm^3 ผลชิ้นเนื้อจาก fine needle aspiration ที่ต่อมน้ำเหลืองพบ necrotizing granulomatous lymphadenitis ย้อมไม่พบเชื้อ แต่เพาะเชื้อขึ้นเป็น *H. capsulatum* ผู้ป่วยได้รับยาด้านไวรัสเอชไอวีต่อและ

อาการค่อน้ำเหลืองอักเสบในผู้ป่วยหายเองโดยไม่ได้ยาต้านเชื้อราเพิ่มเติม⁴²

Cryptococcus neoformans

กลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกัน จากเชื้อ *Cryptococcus neoformans* มักเกิดหลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวีภายในอาทิตย์แรกโดยมักพบอาการของ meningitis ที่มีเม็ดเลือดขาวในน้ำไขสันหลังจำนวนมากขึ้นกว่าตอนก่อนได้ยา แต่ระดับ *Cryptococcus* antigen titer ในน้ำไขสันหลังลดลงและเพาะเชื้อจากน้ำไขสันหลังไม่ขึ้น ในรายที่ได้ยาด้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื่องนานหลายเดือนถึงปียังพบ

อาการค่อน้ำเหลืองอักเสบ และ subcutaneous nodule นอกเหนือจากอาการทางสมอง ผลขึ้นเนื้อของรอยโรคจะพบการอักเสบแบบ granulomatous inflammation และ material คล้ายเชื้อ *Cryptococcus spp* แต่เพาะเชื้อไม่ขึ้น^{40,72}

Cytomegalovirus

นอกจากกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันจะแสดงออกทางโรคตาแล้ว ยังพบรอยโรคอักเสบที่อวัยวะอื่นๆ ได้ เช่น ลำไส้ใหญ่, ตับอ่อน และผิวหนัง โดยพบเป็นแผลที่ผิวหนัง^{40,73,74}

Kaposi's sarcoma

มีรายงานการเกิด Kaposi's sarcoma⁷⁵ หรือ multicentric Castleman's disease^{76,77,78} ส่วนใหญ่พบหลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวีนานเฉลี่ย 5-8 สัปดาห์ โดยจะพบขนาด nodule ที่รอยโรคใหญ่มากขึ้น รอยโรคที่ใหญ่ขึ้นอาจทำให้เกิดการปิดกั้นทางเดินหายใจ หรือเกิดการอุดตันของท่อน้ำเหลืองทำให้เกิด lymphedema ได้ หรือเกิดรอยโรคที่อวัยวะภายใน เช่น ปอด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ การ

เกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันของ Kaposi's sarcoma มักมีอาการรุนแรงพบอัตราการเสียชีวิตประมาณ 60% ดังนั้นจึงแนะนำการรักษาโดยให้ยาเคมีบำบัด ตั้งแต่ช่วงแรกของโรคเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีรอยโรคที่ปอด จะทำให้รอยโรคเล็กลงและลดอัตราการเสียชีวิตได้⁷⁷

Leishmania spp

รายงานการเกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันด้านทานจากเชื้อ *Leishmania spp*^{79,80} พบมากที่อวัยวะภายใน แต่มีรายงานหนึ่งรายที่มีอาการและอาการแสดงที่ผิวหนัง โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี มีระดับ CD4 150 cell/mm³ พบติดเชื้อ *Leishmania spp* ที่ผิวหนังก่อนได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี และได้รับการรักษาด้วยยา amphotericin B และยาด้านไวรัสเอชไอวีพร้อมกัน หลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี 2 เดือน ระดับ CD4 ขึ้นเป็น 311 cell/mm³ แต่ผู้ป่วยมี subcutaneous nodules เกิดมากขึ้น แต่ไม่พบเชื้อจากการเพาะเชื้อและ PCR คิดว่าอาการและอาการแสดงดังกล่าวเกิดจากการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันด้านทานจากเชื้อ *Leishmania spp* จึงให้ยาด้านไวรัสเอชไอวีต่อร่วมกับ fluconazole และติดตามผู้ป่วยต่ออีก 10 เดือน พบว่ารอยโรคทั้งหมดหายสนิท⁸¹

โรค folliculitis

มีรายงานการเกิด folliculitis จากยีสต์ที่ผิวหนัง⁸² และ Demodex ว่าเป็นกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันด้านทาน รวมทั้ง Eosinophilic folliculitis ซึ่งจะปรากฏอีกครั้งหลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวีแล้วระดับ CD4 กลับขึ้นมาถึงระดับประมาณ 200 cells/mm³^{11,22} มักเกิดหลังจากได้ยาภายใน 1-3 สัปดาห์แรก พบลักษณะเป็นผื่นทั้งแบบ macule,

papule หรือ pustule จะมีอาการคันเด่น บุครอยโรค
ข้อม 10% potassium hydroxide พบ demodex mites
จำนวนมาก ตอบสนองดีต่อยาทา อาการจะดีขึ้นหลัง
ให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื่อง⁸³

Sarcoidosis

Sarcoidosis เป็นอีกโรคที่ได้รับการรายงานว่าเป็น
กลุ่มอาการและอาการแสดงการพ่นตัวของภูมิ
ต้านทาน พบรอยโรคที่ผิวหนังแบบ erythema
nodosum⁴⁰ จากผลขึ้นเนื้อพบการอักเสบแบบ
granulomatous inflammation และพบ CD4 T
lymphocyte ใน granuloma ด้วย⁸⁴⁻⁸⁶ การอักเสบ
ดังกล่าวอาจพบได้ที่อวัยวะอื่นๆ ด้วยนอกจากที่
ผิวหนัง สิ่งสำคัญในการวินิจฉัยคือ ต้องไม่พบกลุ่ม
อาการและอาการแสดงการพ่นตัวภูมิต้านทานของเชื้อ
อื่นเช่น mycobacteria, cryptococci และ histoplasma
ที่สามารถทำให้เกิด granulomatous inflammation
กลุ่มอาการต่างๆ จาก sarcoid จะหายได้เองหลัง
รับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื่อง ยา
corticosteroid อาจพิจารณาในผู้ป่วยบางรายซึ่ง
ส่วนมากผู้ป่วยจะตอบสนองดีต่อยา corticosteroid⁸⁷

Acne vulgaris

Acne vulgaris มีรายงานว่าเป็นผลจากการพ่นตัว
ของภูมิต้านทาน ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีหลังได้ยา
ต้านไวรัสเอชไอวี 2 เดือน พบเป็นลักษณะ
comedones, ตุ่มแดง (erythematous papules) และตุ่ม
หนอง (pustules) ที่หน้าผาก แก้ม และส่วนบนของ
ลำตัว เค้นบริเวณรูขุมขน (follicular) ผลเพาะเชื้อ
(bacterial culture) ของตุ่มหนอง เป็น
Propionibacterium acnes ตอบสนองดีต่อการรักษา
ด้วยยาทา erythromycin ในผู้ป่วยรายนี้หลังได้ยาต้าน

ไวรัสเอชไอวีมีระดับ CD4 และ CD8 เพิ่มขึ้น โดยมี
การเพิ่มของระดับ CD8 อย่างมากและรวดเร็วก่อนที่
CD4 จะทำงานได้เต็มที่ ซึ่งคล้ายกับที่พบในเกิดภาวะ
พ่นตัวของภูมิต้านทานในผู้ป่วยที่มาด้วยโรคเอดส์⁸⁸

Human Papilloma Virus

มีสองรายงานพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของหูดที่ปาก
(oral warts) และหูดที่ผิวหนัง (cutaneous warts)
หลังจากผู้ป่วยได้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ทำให้มีความ
เป็นไปได้ว่าเป็นกลุ่มอาการและอาการแสดงของการ
พ่นตัวของภูมิต้านทานต่อเชื้อ human
papillomavirus^{78,89}

Molluscum contagiosum

มีรายงานพบรอยโรคของเชื้อ *Molluscum
contagiosum* ที่มีการอักเสบมากขึ้น หลังได้ยาต้าน
ไวรัสเอชไอวี ซึ่งอาจเกิดจากการพ่นตัวของภูมิ
ต้านทาน^{34,90} เชื้ออื่นๆที่มีรายงานการเกิดกลุ่มอาการ
และอาการแสดงการพ่นตัวของภูมิต้านทาน

มีรายงานในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี พบรอยโรคแบบ
angular cheilitis จากเชื้อ *Candida albicans* และ tinea
corporis เกิดขึ้น หลังได้ยาต้านไวรัสเอชไอวี⁹¹
นอกจากนี้ยังมีรายงานการเกิดกลุ่มอาการ Reiter's
syndrome จากเชื้อ *Chlamydia trachomatis* หลังได้ยา
ต้านไวรัสเอชไอวี⁹²

นอกจากนี้ยังพบกลุ่มอาการและอาการแสดง
บางอย่างที่ไม่สามารถระบุตัวกระตุ้นได้ เช่น แพ้รอย
สัก สีหรือหมึก⁴¹ เกิดขึ้นหลังได้ยาต้านไวรัสเอชไอวี
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงการ
พ่นตัวของภูมิต้านทานของการติดเชื้อ (Risk factors
for infectious IRD) ได้แก่

1. การที่ยังมีเชื้อฉวยโอกาสอยู่ในร่างกายไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอาการแสดงของการติดเชื้อ ไม่ว่าเชื้อมีชีวิตหรือไม่ก็ได้ เช่น จากเชื้อ *Cryptococcus spp* และ CMV ที่ไม่มีชีวิตก็สามารถเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้⁴² ทำให้สามารถอธิบายได้ว่าการให้ยาป้องกันการติดเชื้อ MAC ไม่สามารถป้องกันการเกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันด้านทานของเชื้อ MAC ได้⁹²

2. ระดับ CD4 T-lymphocyte ที่ต่ำกว่า 50-100 cells/mm³ ก่อนเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวี เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันด้านทาน^{33,77} เพราะเป็นการบ่งบอกถึงการที่มีเชื้ออยู่จำนวนมากก่อนได้ยา และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการผิดปกติของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน (immune dysregulation) ระหว่างฟื้นตัวของภูมิคุ้มกัน ดังนั้นการเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีควรรีบให้ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีก่อนที่ระดับ CD4 จะลดต่ำลงน้อยกว่า 100 cells/mm³ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันด้านทาน

3. การพบยีนที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันด้านทาน (susceptibility genes) สำหรับบางเชื้อโรค เช่น ในเชื้อ herpes virus พบว่าสัมพันธ์กับ HLA-B44 และ major histocompatibility complex (MHC) ancestral haplotype HLA-A2, -B44, -DR4⁹³ และ allele 1 ที่ single nucleotide polymorphism (SNP) ใน 39UTR ของ IL12B gene encoding IL-12 p40⁹⁴ และเชื้อ mycobacterium เกี่ยวกับ TNFA-308*2 and IL6-174*G genes

4. ระดับ CD4 หลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวีที่เพิ่มขึ้นมากและรวดเร็ว⁹⁵

5. ผู้ป่วยที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อมาก่อน โดยพบในผู้ป่วยเด็กที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ VZV ทั้งๆ ที่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นในการเกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันด้านทานต่อเชื้อ VZV หลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี โดยอาการจะแสดงในรูปงูสวัด⁹⁶

6. จำนวนเชื้อโรคฉวยโอกาสที่ผู้ป่วยติดเชื้อก่อนได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี ถ้ามีจำนวนมากจะมีความเสี่ยงมากขึ้น⁹⁷

7. ระดับ Hemoglobin ที่ต่ำโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10.95 g/dl ก่อนได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี⁹⁷

8. ผู้ป่วยที่ได้ยาด้านไวรัสเอชไอวีภายใน 30 วัน หลังติดเชื้อฉวยโอกาส จะมีความเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันด้านทาน มากกว่าผู้ป่วยที่ได้ยาหลังติดเชื้อมากกว่า 30 วัน⁹⁸

9. ผู้ป่วยที่ได้รับการต้านไวรัสเอชไอวีหลังจากมีการติดเชื้อฉวยโอกาสแล้ว⁹⁸

10. ผู้ป่วยที่มีระดับ HIV RNA ลดลงอย่างรวดเร็ว หลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวี⁹⁸

การวินิจฉัยกลุ่มอาการและอาการแสดงของภาวะฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันด้านทาน (Diagnosis of s IRIS)

เนื่องจากกลุ่มอาการนี้ยังไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจน ทำให้มีปัญหาในการวินิจฉัย จึงมีการศึกษาหลายรายงานพยายามตั้งเกณฑ์การวินิจฉัย โดยจากการศึกษาแบบ retrospective⁴² ได้เสนอเกณฑ์การวินิจฉัยกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันด้านทานจากการติดเชื้อ (infectious IRIS) ไว้ดังนี้ โดยการวินิจฉัยต้องอาศัยเกณฑ์การวินิจฉัยหลัก ก. และ ข.

หรือเกณฑ์การวินิจฉัยหลัก ก และเกณฑ์การวินิจฉัย
รอง 2 ข้อ

**เกณฑ์การวินิจฉัยกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้น
ตัวของภูมิคุ้มกัน⁴²**

เกณฑ์การวินิจฉัยหลัก

ก. อาการและอาการแสดงที่ผิดปกติ (atypical presentation) ของการติดเชื้อฉวยโอกาสหรือเนื้องอก (tumours) ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี

- อาการเฉพาะที่ เช่น ที่ต่อมน้ำเหลือง, ตับ, ม้าม

- อาการและอาการแสดงของการอักเสบที่รุนแรง เช่น ไข้สูงโดยไม่มีสาเหตุอื่นอธิบายได้ หรือรอยโรคที่มีอาการเจ็บปวด

- การอักเสบตอบสนองที่ผิดปกติ (atypical inflammatory response) ในอวัยวะต่างๆ เช่น granulomas, suppuration, necrosis , perivascular lymphocytic inflammatory cell infiltrate

- อวัยวะต่างๆ ทำงานล้มเหลวมากขึ้น (progression of organ dysfunction) หรือรอยโรคเดิมที่ดีขึ้นแล้วหลังได้รักษาเฉพาะโรคมีการขยายใหญ่ขึ้นหลังได้ยาต้านไวรัสเอชไอวี และไม่สามารถอธิบายได้จากผลข้างเคียงของยาและการวินิจฉัยโรคอื่น เช่น การเกิดหรือใหญ่ขึ้นของรอยโรคที่เนื้อสมองหลังการรักษา cerebral cryptococcosis หรือ toxoplasmosis, ปอดอักเสบ (pneumonitis หรือ pneumonia) ที่เกิดขึ้นหลังได้รับการรักษาวัณโรคปอดหรือ PCP, การเกิดขึ้นหรือแย่ลงของ uveitis/vitritis หลังที่อาการของ CMV retinitis ดีขึ้น, ไข้และ cytopenia หลังการรักษา disseminated MAC, การขยายขนาดรอยโรค Kaposi's sarcoma และดีขึ้นโดยไม่ได้รับการฉายแสง, ยาเคมีบำบัด

ข. ระดับ HIV RNA ที่ลดลง 1 log10 copies/mL

เกณฑ์การวินิจฉัยรอง

- การเพิ่มของระดับ CD4 T-cell หลังได้ยาต้านไวรัสเอชไอวี

- ภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นต่อสิ่งกระตุ้น เช่น การตอบสนองแบบ DTH ต่อ mycobacterial antigens

- อาการและอาการแสดงที่หายเองโดยไม่ได้รับยาฆ่าเชื้อหรือยาเคมีบำบัดต่อเชื้อโรคหรือเนื้องอก และได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื่อง

จากการศึกษาของ Shelburne และคณะ⁴³ ได้เสนอเกณฑ์การวินิจฉัยดังนี้

1. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดส์

2. ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีและมีการเพิ่มขึ้นของ CD4 T lymphocytes และมีการลดลงของ HIV-1 viral load

3. อาการและอาการแสดงที่เข้าได้กับการติดเชื้อหรืออักเสบระหว่างการได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี

4. อาการและอาการแสดงไม่สามารถอธิบายได้จากการติดเชื้ออื่นใหม่หรือการดำเนินโรคของเชื้อที่เคยติด หรือผลข้างเคียงจากยา

จากการศึกษาของ Jaime Robertson และคณะ⁹⁷ ได้เสนอเกณฑ์การวินิจฉัย แบบ predictive model จากการวิเคราะห์ classification และ regression tree analysis โดยดูจากจำนวนการติดเชื้อฉวยโอกาสมาก่อน, ระดับ CD8+ cell และ ระดับ hemoglobin ก่อนการรักษา

การรักษา (Management and Treatment)

การรักษากลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันยังไม่มีแนวทางแน่นอน ขึ้นกับประสบการณ์และคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แต่สิ่ง

สำคัญคือ ต้องไม่มีสาเหตุอื่นที่อธิบายอาการดังกล่าวได้ เช่น ผลข้างเคียงของยาที่ได้รับ, โรคที่เป็นมากขึ้น เนื่องจากการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ไม่ถูกต้อง, การดื้อยาของเชื้อไวรัสเอชไอวี, การดูดซึมผิดปกติของยา (malabsorption) หรือการที่ยาไม่ได้รับระดับที่ต้องการเนื่องจากมีผลจากยาอื่นที่ใช้ร่วมกัน (drug interactions)

ในช่วงต้นของกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันของเชื้อ herpes virus การให้ยาด้านไวรัส herpes มีความสำคัญ โดยส่วนมากรอยโรคที่ผิวหนังจากเชื้อ HSV จะตอบสนองดีมากกับการรับประทานยา acyclovir (600mg/day) ส่วนรอยโรคจากเชื้อ VZV พบว่าตอบสนองดีต่อการรับประทานยา acyclovir ขนาดต่ำๆ หรือยา famciclovir³³

ส่วนกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันของเชื้อ *Mycobacterium spp.* โดยการให้ยาฆ่าเชื้อ (anti-mycobacterium therapy) ตามความไวของเชื้อต่อยาแต่ละชนิด รวมถึงเชื้อ *Mycobacterium leprae* ด้วย อาการจะตอบสนองดีต่อการรักษา และไม่จำเป็นต้องหยุดยาด้านไวรัสเอชไอวี การให้ยา corticosteroids หรือยาแก้อักเสบ (NSAIDS)¹⁰⁰ พิจารณาใช้ในผู้ป่วยบางรายที่อาการรุนแรงหรือตอบสนองต่อยาฆ่าเชื้อไม่ดี ส่วนยา pentoxifylline พบว่าได้ผลดีในกลุ่มอาการที่เกิดจากเชื้อวัณโรค⁴²

ในรอยโรคที่เกี่ยวกับ Kaposi's sarcoma เนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตสูง ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำพิจารณาให้ยาเคมีบำบัด (systemic chemotherapy) เช่น liposomal doxorubicin , Paclitaxel ตั้งแต่ระยะแรกของโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีรอยโรคในปอดซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมาก ผู้ป่วยส่วนมากมักตอบสนองดี

ต่อยาเคมีบำบัดและไม่จำเป็นต้องหยุดยาด้านไวรัสเอชไอวี สามารถหยุดยาเคมีบำบัดได้หลังได้ยาด้านไวรัสเอชไอวีอย่างต่อเนื่องและรอยโรคยุบลง การใช้ external beam radiation ให้พิจารณาเป็นรายๆ⁷⁹ การรักษาต้องดูตามอาการของผู้ป่วยแต่ละราย ในรายที่มีอาการมากและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง อาจพิจารณาให้ยา systemic corticosteroid ส่วนขนาดยาและระยะเวลาที่ให้อย่างไม่แน่ชัด ให้ปรับตามอาการของผู้ป่วยแต่ละราย²⁸ ยาอื่นที่ทำหน้าที่ immune modulation เช่น thalidomide, intravenous immunoglobulins มีรายงานการใช้ โดยพิจารณาตามประสบการณ์ของผู้รักษา⁹⁹

ภาวะ folliculitis จากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อ demodex มีรายงานการใช้ Permethrin cream และ metronidazole gel ถ้าอาการไม่ดีขึ้น พิจารณาใช้ยา ivermectin (200 g/kg body weight) รับประทานครั้งเดียว อาการจะดีขึ้นในหนึ่งเดือน การให้ยา ivermectin จะต้องระวังเกิด drug interaction กับยาด้านไวรัสเอชไอวี และเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ พิจารณาให้ ivermectin และยาทาอาทิตย์ละครั้งต่ออีก 4 สัปดาห์⁸³ ส่วน folliculitis อื่นๆ อาจพิจารณายา corticosteroid แบบทาหรือรับประทานโดยดูจากความรุนแรงของอาการ¹⁰¹

กลุ่มอาการต่างๆ จากโรค sarcoid จะหายได้เองหลังรับประทานยาด้านไวรัสเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง ยา corticosteroid พิจารณาให้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงซึ่งผู้ป่วยส่วนมากจะตอบสนองดีต่อยาคorticosteroid⁸⁷

การหยุดยาด้านไวรัสเอชไอวี เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ในการลดอาการและอาการแสดงต่างๆ

แต่ควรพิจารณาเป็นการรักษาสุดท้าย หลังจากรักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผลแล้ว เพราะการหยุดยาจะทำให้เชื้อไวรัสเพิ่มจำนวนขึ้นมาและเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อค็อซมาตามมา²⁸

ในอนาคตการค้นหายาผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการฟื่นตัวของภูมิต้านทานและปัจจัยที่จะทำให้อาการและอาการแสดงนี้เป็นมากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อจะได้เฝ้าระวังในผู้ป่วยที่จะเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวี ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องระบุให้ชัดเจน ปัจจุบันแนะนำให้เริ่มในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีระดับ CD4 มากกว่า 100 cell/mm³ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการและอาการแสดงการฟื่นตัวของภูมิต้านทาน⁷⁷ ส่วนการให้ยาป้องกันการอักเสบ (prophylactic anti-inflammatory therapy) คงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

References

- Reynaud-Mendel B, Janier M, Gerbaka J, et al. Dermatological finding in HIV-infected patients: A prospective study with emphasis on CD4+ cell count. *Dermatology* 1996;192:325-8.
- Schaub N, Gilli L, Ruffi T, et al. Epidemiology of skin disease in HIV-infected patients: A prospective cohort study. *Schweiz Rundsch Med Prax* 1996;85:1162-6.
- Coldiron BM, Bergstresser PR. Prevalence and clinical spectrum of skin disease in patients infected with human immunodeficiency virus. *Arch Dermatol* 1988;125:357-61.
- Zalla MJ, SU WPD, Fransway AF. Dermatologic manifestation of human immunodeficiency virus infection. *Mayo Clin Proc* 1992;67:1089-108.
- Handa S, Bingham JS. Dermatological immune restoration syndrome: does it exist. *J EADV* 2001;15:430-2.
- Charle Darley. The prevalence of skin disease in HIV infection. *AIDS Patient Care STDs* 1998;12:849-52
- Uthayakumar S, Nandwani R, Drinkwater T, Nayagam A, Darley C. The prevalence of skin disease in HIV infection and its relationship to the degree of immunosuppression. *Br J Dermatol* 1997;137:595-8.
- Tschachler E, Bergstresser PR, Stingl G. HIV-related skin disease. *Lancet* 1996;348:659-63.
- Dyche JA, Hay RJ. HIV. the skin and the impact of antiretroviral therapy. *Curr opin in infect Dis* 2000;13:99-101.
- Aftergut K, Cockerell CJ. Update on the cutaneous manifestation of HIV infection. *Clinical and Pathologic features. Dermatol clin* 1999;17:445-71.
- Porras B, Costner M, Freidman-Kien AE, Cockerell CJ. Update on cutaneous manifestation of HIV infection. *Med Clin North Am* 1998;82:1033-80.
- Ledermann MM, Valdez H. Immune restoration with antiretroviral therapies : implication for clinical management. *JAMA* 2000;284:223-8.
- Sepkowitz KA. Effect of HAART on natural history of AIDS related opportunistic disorder. *Lancet* 1998;351:228-30.
- Palella FJ Jr, Delaney KM, Moorman AC, et al. Declining morbidity and mortality among patients with advanced human immunodeficiency virus infection. *N Engl J Med* 1998; 338: 853-60.
- Michaels S, Clark R, Kissinger P. Declining morbidity and mortality among patients with advanced human immunodeficiency virus infection. *N Engl J Med* 1998; 339: 405-6.
- Jacobson MA, French M. Altered natural history of AIDS — related opportunistic infections in the era of potent combination antiretroviral therapy. *AIDS* 1998; 12: S157-S163.
- Powderly WG, Landay A, Ledermann MM. Recovery of the immune system with antiretroviral therapy: the end of opportunism. *JAMA* 1998; 280: 72-7.
- Autran B, Carcelain G, Li TS et al. Positive effects of combined antiretroviral therapy on CD4+ T cells homeostasis and function in advanced HIV disease. *Science* 1997;277:112-6.
- Li TS, Tubiana R, Katlama C et al. Long-lasting recovery in CD4 T-cell function and viral load reduction after highly active antiretroviral therapy in advanced HIV-1 disease. *Lancet* 1998;351:1682-6.
- Nokta MA, Li XD, Nichols J, et al. Homeostasis of naïve and memory T cell subpopulations in peripheral blood and lymphoid tissue in the context of human immunodeficiency virus infection. *J Infect Dis* 2001;183:1336-42.
- Fischer T, Schworer H, Vente C, Reich K, Ramadori G, et al. Clinical improvement of HIV-associated psoriasis parallels a reduction of HIV viral load induced by effective antiretroviral therapy. *AIDS* 1999;13:628-9.
- Costner M, Cockerell CJ. The changing spectrum of the cutaneous manifestations of HIV disease. *Arch Dermatol* 1998;134 : 1290—2.
- Spach DH, Colvern R. Resolution of recalcitrant hand warts in an HIV-infected patient treated with potent antiretroviral therapy. *J Am Acad Dermatol* 1999;40:818-21.
- Krischer J, Rutschmann O, Hirschel B et al. Regression of Kaposi's sarcoma during therapy with

- HIV-1 protease inhibitors: a prospective pilot study. *J Am Acad Dermatol* 1998;38: 594–8.
25. De Milito A, Catucci M, Venturi G et al. Antiretroviral therapy with protease inhibitors in human immunodeficiency virus type-1 and human herpes virus 8-coinfected patients. *J Med Virol* 1999;57:140–4.
26. Hurmi MA, Bohlen L, Furrer H, Braathenc R. Complete regression of giant molluscum contagiosum lesions in an HIV-infected patient following combined antiretroviral therapy with saquinavir, zidovudine and lamivudine. *AIDS* 1997;11: 1784–5.
27. Hicks CB, Myers SA, Giner J. Resolution of intractable molluscum contagiosum in a human immunodeficiency virus infected patient after institution of antiretroviral therapy with ritonavir. *Clin Infect Dis* 1997;24: 1023–5.
28. Lipman M, Breen R. Immune reconstitution inflammatory syndrome in HIV. *Curr Opin Infect Dis* 2006 Feb; 19(1):20–5.
29. Martinez E, Gatell JM, Moran Y et al. High incidence of herpes zoster after starting antiretroviral therapy with a protease inhibitor. Paper presented at: 5th Conference on Retrovirus and Opportunistic Infections; February 3. Chicago, IL, 1998: Abstr. 501.
30. Aldeen T, Hay P, Davidson F, Lau R. Herpes zoster infection in HIV- seropositive patients associated with highly active antiretroviral therapy. *AIDS* 1998;12(13): 1719–20.
31. Rodriguez-Rosado R, Soriano V, Dona C, Gonzalez-Lahoz J. Opportunistic infections shortly after beginning highly active antiretroviral therapy. *Antivir Ther* 1998; 3 (4): 229–31.
32. Martinez E, Gatell J, Moran Y, Aznar E, Guelar A, et al. High incidence of Herpes zoster in patients with AIDS soon after treatment with protease inhibitors. *Clin Infect Dis* 1998;27:1510–3.
33. French MA, Lenzo N, John M, et al. Immune restoration disease after the treatment of immunodeficient HIV-infected patients with highly active antiretroviral therapy. *HIV Med* 2000;1(2):107–15.
34. Fox PA, Barton SE, Francis N et al. Chronic erosive herpes simplex virus infection of the penis, a possible immune reconstitution disease. *HIV Med* 2000;1: 10–8.
35. Carcelain G, Debre P, Autran B. Reconstitution of CD4+ T lymphocytes in HIV-infected individuals following antiretroviral therapy. *Curr Opin Immunol* 2001;13:483–8.
36. Cheng VC, Yuen KY, Chan YM, et al. Immunorestitution disease involvement the innate and adaptive response. *Clin Infect Dis* 2000;30:882–92.
37. Deayton JR, Sabin CA, Britt WB, et al. Rapid reconstitution of humoral immunity against cytomegalovirus but not HIV following highly active antiretroviral therapy. *AIDS* 2002;16:2129–35.
38. Foudraine Na, Hovenkamp E, Notermans DW, et al. Immunopathology as a result of highly active antiretroviral therapy in HIV-1 infected patients. *AIDS* 1999;13:177–84.
39. Samuel A. Shelburne III and Richard J. Hamill. The Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome. *AIDS Rev* 2003;5:67–79.
40. Michailidis C, Pozniak AL, Mandalia S, et al. Clinical characteristics of IRIS syndrome in patients with HIV and tuberculosis. *Antivir Ther* 2005;10:417–22.
41. Stone S., Price P, French M. Immune Restoration Disease: A Consequence of Dysregulated Immune Responses After HAART. *Current HIV Research* 2004; 2: 235–42.
42. French MA, Price P, Stone SF. Immune restoration disease after antiretroviral therapy [EDITORIAL REVIEW]. *AIDS* 2004 ;18(12):1615–27.
43. Shelburne S, Hamill R, Rodríguez-Barradas M, et al. Immune reconstitution inflammatory syndrome: emergence of a unique syndrome during highly active antiretroviral therapy. *Medicine* 2002 ;81:213–27.
44. Domingo B, Torres O, Ris J, et al. Varicella zoster virus as an immune reconstitution disease after initiation of combination antiretroviral therapy in HIV- infected patients. *Am J Med* 2001;110:605–9.
45. French M, Mallal SA, Dawkins RL. Zidovudine induced restoration of cell-mediated immunity to mycobacteria in immunodeficient HIV-infected patients. *AIDS* 1992; 6:1293–7.
46. Mallal SA, James IR, French MAH. Detection of subclinical *Mycobacterium avium* intracellular complex infection in immunodeficient HIV-infected patients treated with zidovudine. *AIDS* 1994; 8:1263–9.
47. Dworkin MS, Fratzkin MD. *Mycobacterium avium* complex lymph node abscess after use of highly active antiretroviral therapy in a patient with AIDS. *Arch Intern Med* 1998 ;158:1828–38.
48. Cabie A, Abel S, Brebion A, Desbois N, Sobesky G. Mycobacterial lymphadenitis after initiation of highly active antiretroviral therapy. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 1998; 17:812–3.
49. Phillips P, Kwiatkowski MB, Copland M, Craib K, Montaner J. Mycobacterial lymphadenitis associated with the initiation of combination antiretroviral therapy. *J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol* 1999; 20:122–8.
50. Schwietert M, Battegay M. Focal mycobacterial lymphadenitis after starting highly active antiretroviral treatment. *Dtsch med Wschr* 1999; 124:45–8.
51. Bartley PB, Allworth AM, Eisen DP. *Mycobacterium avium* complex causing endobronchial disease in AIDS patients after partial immune restoration. *Int J Tuberculosis Lung Dis* 1999; 3:1132–6.
52. Price LM, O'Mahoney C. Focal adenitis developing after immune reconstitution with HAART. *Int J STD AIDS* 2000; 11:685–6.

53. Hassell M, French MA. Mycobacterium avium infection and immune restoration disease after highly active antiretroviral therapy in a patient with HIV and normal CD4+ counts. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2001; 20:889–91.
54. Salama C, Policar M, Venkataraman M. Isolated pulmonary Mycobacterium avium complex infection in patients with human immunodeficiency virus infection: case reports and literature review. *Clin Infect Dis* 2003; 37:e35–e40.
55. del Giudice P, Durant J, Counillon E, et al . Mycobacterial cutaneous manifestations : a new sign of immune restoration syndrome in patients with acquired immunodeficiency syndrome. *Arch Dermatol* 1999 Sep;135:1129-30.
56. Race EM , Adelson-Mitty J , Kriegel GR , et al . Focal mycobacterial lymphadenitis following initiation of protease inhibitor therapy in patients with advanced HIV-1 disease. *Lancet* 1998;351:252-5.
57. Sotto A, Guillot B, Dandurand M, Jourdan J. Exacerbation of skin mycobacterial lesions under highly active antiretroviral therapy in an HIV-infected patient. *AIDS* 1999;13(3): 1790–1.
58. Brown M, Williams I, Miller R. Deterioration of disseminated cutaneous Mycobacterium avium complex infection with a leukemoid reaction following institution of highly active antiretroviral therapy. *Sex Transm Infect* 2001 ;77:149-50.
59. Lawn SD, Bicanic TA, Macallan DC. Pyomyositis and cutaneous abscesses due to Mycobacterium avium: an immune reconstitution manifestation in a patient with AIDS. *Clin Infect Dis* 2004; 38:461–3.
60. Puthanakit T, Oberdorfer P, Ukarapol N, et al. Immune reconstitution syndrome from nontuberculous mycobacterial infection after initiation of antiretroviral therapy in children with HIV infection . *Pediatr Infect Dis J* 2006; 25(7) : 645-7.
61. Narita M, Ashkin D, Hollender ES, Pitchenik AE. Paradoxical worsening of tuberculosis following antiretroviral therapy in patients with AIDS. *Am J Respir Crit Care Med* 1998; 158: 157–61.
62. Crump JA, Tyrer MJ, Lloyd-Owen SJ. Miliary tuberculosis with paradoxical expansion of intracranial tuberculomas complicating human immunodeficiency virus infection in a patient receiving highly active antiretroviral therapy. *Clin Infect Dis* 1998; 26:1008–9.
63. Furrer H-J, Malinverni R. Systemic inflammatory reaction after starting highly active antiretroviral therapy in AIDS patients treated for extrapulmonary tuberculosis. *Am J Med* 1999;106:371–2.
64. Kunimoto DY, Chui L, Nobert E, Houston S. Immune mediated ‘HAART’ attack during treatment for tuberculosis. Highly active antiretroviral therapy. *Int J Tuberc Lung Dis* 1999;3:944–7.
65. Chien JW, Johnson JL. Paradoxical reactions in HIV and pulmonary TB. *Chest* 1998; 114:933–6.
66. Fishman JE, Saraf-Lavi E, Narita M, Hollender ES, Ramsinghani R, Ashkin D. Pulmonary tuberculosis in AIDS patients: transient chest radiographic worsening after initiation of antiretroviral therapy. *Am J Roentgenol* 2000; 174:43–9.
67. Navas E, Martin-Davila P, Moreno L, et al. Paradoxical reactions of tuberculosis in patients with the acquired immunodeficiency syndrome who are treated with highly active antiretroviral therapy. *Arch Intern Med* 2002; 162:97–9.
68. Lawn SD, Macallan DC. Hypercalcemia: a manifestation of immune reconstitution complicating tuberculosis in an HIV-infected person. *Clin Infect Dis* 2004; 38:154–5.
69. Sharp MJ, Mallon DFJ. Regional Bacillus Calmette-Guerin lymphadenitis after initiating anti-retroviral therapy in an infant with human immunodeficiency virus type 1 infection. *Ped Infect Dis J* 1998; 17:660–2.
70. Lawn SD, Wood C, Lockwood DN. Borderline tuberculoid leprosy: an immune reconstitution phenomenon in a human immunodeficiency virus-infected person. *Clin Infect Dis* 2003;36:e5–e6.
71. Pignataro P, Rocha Ada S., Nery JA ,et al. Leprosy and AIDS: two cases of increasing inflammatory reactions at the start of highly active antiretroviral therapy. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2004;23:408–11.
72. Manfredi R, Pieri F, Pileri S, et al. The changing face of AIDS related opportunism: cryptococcosis in the highly active antiretroviral therapy (HAART) era. Case reports and literature review. *Mycopathologia* 1999;148:73-8.
73. Gilquin J, Piketty C, Thomas V, et al. Acute cytomegalovirus infection in AIDS patients with CD4+ counts above 100x106 cells/L following combination antiretroviral therapy including protease inhibitors. *AIDS* 1997;11:1159-60.
74. Qazi N, Morlese J, Walsh J, et al. Severe cutaneous ulceration secondary to cytomegalovirus inclusion disease during successful immune reconstitution with HAART. *AIDS Read* 2002 ; 12:452-7.
75. Greenspan D, Canchola AJ, MacPhail LA, Cheikh B, Greenspan JS. Effect of highly active antiretroviral therapy on frequency of oral warts. *Lancet* 2001; 357:1411–2.
76. King MD, Reznik DA, O’Daniels CM, Larsen NM, Osterholt D, Blumberg HM. Human papillomavirus-associated oral warts among human immunodeficiency virus-seropositive patients in the era of highly active antiretroviral therapy: an emerging infection. *Clin Infect Dis* 2002; 34:641–8.
77. Jevtovic DJ , Salemovic D, Ranin J, et al .The prevalence and risk of immune restoration disease in HIV-infected patients treated with highly active antiretroviral therapy. *HIV Medicine* 2005;6:140–3.
78. Weir A, Wansbrough-Jones M. Mucosal Kaposi’s sarcoma following protease inhibitor therapy in an HIV-infected patient. *AIDS* 1997; 11:1895–6.
79. Bouscarat F, Maubec E, Matheron S, Descamps V. Immune recovery inflammatory folliculitis. *AIDS* 2000; 14:617–8.

80. Delfos NM, Collen AF, Kroona FP. Demodex folliculitis: a skin manifestation of immune reconstitution disease AIDS 2004;18:701–8.
81. Blanche P, Gombert B, Rivoal O, Abad S, Salmon D, Brezin A. Uveitis due to Leishmania major as part of HAART-induced immune restitution syndrome in a patient with AIDS. Clin Infect Dis 2002; 34:1279–80.
82. Zietz C, Bogner JR, Goebel FD, Lohs U. An unusual cluster of cases of Castleman's disease during highly active antiretroviral therapy for AIDS. N Engl J Med 1999; 340:1923–4.
83. Leidner R, Aboulafia D. Recrudescence Kaposi's Sarcoma After Initiation of HAART: A manifestation of Immune Reconstitution Syndrome AIDS Patient Care STDs 2005;19:635–44.
84. Ridolfo AL, Gervasoni C, Antinori S, Pizzuto M, Santambrogio S, Trabattoni D, et al. Post-kala-azar dermal leishmaniasis during highly active antiretroviral therapy in an AIDS patient infected with Leishmania infantum. J Infect 2000; 40:199–202.
85. Kerob D, Bouaziz J.D, Sarfati C, et al. First Case of Cutaneous Reconstitution Inflammatory Syndrome Associated with HIV Infection and Leishmaniasis. CID 2006;43:664–5.
86. Neumann S, Kreth F, Schubert S, Mossner J, Caca K. Reiter's syndrome as a manifestation of an immune reconstitution syndrome in an HIV-infected patient: successful treatment with doxycycline. Clin Infect Dis 2003; 36:1628–9.
87. Mirmirani P, Maurer TA, Herndier B, et al. Sarcoidosis in a patient with AIDS: a manifestation of immune restoration syndrome. J Am Acad Dermatol 1999;41: 285–6.
88. Blanche P, Passeron A, Gombert B, Ginsburg C, Salmon D, Sicard D. Sarcoidosis and HIV infection: influence of highly active antiretroviral therapy. Br J Dermatol 1999; 140:1185.
89. Trevenzoli M, Cattelan AM, Marino F, Marchioro U, Cadrobbi P. Sarcoidosis and HIV infection: a case report and a review of the literature. Postgrad Med J 2003; 79:535–8.
90. Foulon G, Wislez M, Naccache JM, et al. Sarcoidosis in HIV-infected patients in the era of highly active antiretroviral therapy. Clin Infect Dis 2004; 38:418–25.
91. A Kreuter, R Schlottmann, P Altmeyer, Nh Brockmeyer. Acne vulgaris as an immune reconstitution syndrome in a patient with AIDS after initiation of antiretroviral therapy. JEADV 2002;16: 638–49.
92. Phillips P, Chan K, Hogg R, Bessuille E, Black W, Talbot J, et al. Azithromycin prophylaxis for Mycobacterium avium complex during the era of highly active antiretroviral therapy: evaluation of a provincial program. Clin Infect Dis 2002; 34:371–8.
93. Price P, Keane NM, Stone SF, Cheong KYM, French MA. MHC haplotypes affect the expression of opportunistic infections in HIV patients. Hum Immunol 2001; 62:157–64.
94. Price P, Morahan G, Huang D, et al. Polymorphisms in cytokine genes define subpopulations of HIV-1 patients who experienced immune restoration diseases. AIDS 2002; 16:2043–7.
95. de Boer M, Kroonl F.P, Kauffmann R.H. Immune restoration disease in HIV-infected individuals receiving highly active antiretroviral therapy: clinical and immunological characteristics. Neth J med 2003;61:408–12.
96. Tangsinmankong N, Kamchaisatian W, Zilbermann J, et al. Varicella zoster as a manifestation of immune restoration disease in HIV-infected children. J Allergy Clin Immunol 2004;113:742–6.
97. Robertson J, Meier M, Wall J, Ying J, Fichtenbaum C. Immune Reconstitution Syndrome in HIV: Validating a Case Definition and Identifying Clinical Predictors in Persons Initiating Antiretroviral Therapy. Clin Infect Dis 2006; 42:1639–46.
98. Shelburne SA, Visnegarwala F, Darcourt J, et al. Incidence and risk factors for immune reconstitution inflammatory syndrome during highly active antiretroviral therapy. AIDS 2005;19:399–406.
99. Hirsch H, Kaufmann G, Sendi P, Battegay M. Immune Reconstitution in HIV-Infected Patients. Clin Infect Dis 2004; 38:1159–66.
100. Burman WJ, Jones BE. Treatment of HIV-related tuberculosis in the era of effective antiretroviral therapy. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164:7–12.
101. Kong H, Myers S. Cutaneous effects of highly active antiretroviral therapy in HIV-infected patients. Dermatol Ther 2005;18:58–66.