


Critical Care Quiz

ผศ. พญ. ภัทริน ภิญโญพานิช
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ป่วยหญิงอายุ 28 ปี มาห้องฉุกเฉินด้วยเหนื่อยมากขึ้น 1 สัปดาห์ Chest X-ray ดังภาพ



ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับภาวะของผู้ป่วยรายนี้

- ก. Beck's triad
- ข. Ewart's sign
- ค. Kussmaul's sign
- ง. Osler's triad


ท่านผู้ใดทราบคำตอบ

สามารถส่งคำตอบของท่านเข้ามาร่วมสนุกลุ้นชิงรางวัลมากมายจากทางสมาคมฯ ได้ที่ admin@criticalcareshai.org หรือส่งมาที่ inbox ของ Facebook: The Thai Society of Critical Care Medicine ท่านที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง เราจะจัดส่งของรางวัลไปให้แก่ท่านถึงที่บ้าน

ด่วน! ของรางวัลมีจำนวนจำกัด

เฉลยคำถามในฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

ผู้ป่วยหญิงอายุ 55 ปี ได้รับการวินิจฉัย schwannoma ที่ right hemithorax ได้รับการผ่าตัด median sternotomy เพื่อตัดก้อนออกแต่ไม่สามารถตัดออกได้ เนื่องจากมีปัญหาเลือดออกจากก้อนปริมาณมาก หลังผ่าตัดมีปัญหา hypoxemia จึงได้รับการใส่ veno-venous Extra Corporeal Membrane Oxygenation (vv-ECMO) จากภาพ chest x-ray ก่อนและหลังผ่าตัด



ข้อใด คือ ภาวะแทรกซ้อนของการใส่สาย ที่พบในผู้ป่วยรายนี้ ?

- ก. Retained guide wire
- ข. Right hemothorax
- ค. Right ventricle perforation
- ง. Malposition of return cannula

คำตอบ

ก. Retained guide wire ผู้ป่วยรายนี้หลังใส่สาย drainage cannula ที่ right internal jugular vein แล้วไม่สามารถดึง guide wire ออกได้ จากภาพ chest x-ray แสดงให้เห็นว่า มาตรการหักพับของ guide wire บริเวณปลาย drainage cannula (ตำแหน่งบริเวณ carina) และปลายสายอยู่ใน right ventricle ผู้ป่วยรายนี้ต้องเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งเพื่อ remove guide wire ออก ภาวะแทรกซ้อนของ retained guide wire ที่อาจเกิดได้ คือ กระตุ้นให้เกิด arrhythmia และ clot ได้