

## I.C.U. Corner

# หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม (MICU)

## โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

นางชัชฎาภา บุญโยประการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม

### แนะนำหอผู้ป่วย

หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม เป็น 1 ใน 6 I.C.U. ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี I.C.U. อื่น ๆ ได้แก่ วิกฤตโรคหัวใจ วิกฤตศัลยกรรมและผ่าตัดหัวใจและทรวงอก วิกฤตกุมารเวชกรรม วิกฤตอุบัติเหตุ วิกฤตศัลยกรรมประสาท MICU รับผู้ป่วยวิกฤตทุกระบบ ปัจจุบันเปิดให้บริการ 8 เตียง (ขยายได้ถึง 14 เตียง) และสำรองเตียงผู้ป่วย stroke fast track 1 เตียง ตลอด 24 ชั่วโมง มีพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด 20 คน พนักงานผู้ช่วยเหลือ 8 คน แพทย์เฉพาะทาง Critical Care 2 คน

ระบบบริการแบบกึ่งปิด (Semi Closed I.C.U.) มีอายุรแพทย์หมุนเวียนเป็น Attending Staff ดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน โดยมีแพทย์เวชบำบัดวิกฤตและ/หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบหายใจเป็นพี่เลี้ยง และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คำปรึกษาได้ทุกสาขา

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มารับบริการอยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายจังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดระยอง บางส่วน มากกว่า 70% เป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อ severe sepsis/septic shock ที่มีภาวะแทรกซ้อน acute respiratory failure และ acute renal failure และ 60% ของผู้ป่วยที่รับไว้มีระดับ Apache II score > 25

### ตำแหน่งที่ตั้ง

ชั้น 5 อาคารอายุรศาสตร์ (7 ชั้น) ตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทและสิ่งแวดล้อมดีมาก ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน สามารถมองเห็นสวนสาธารณะและภูเขาสะพานที่สวยงาม



สมาชิกของพวกเราชาว I.C.U. พระปกเกล้า



ด้านหน้าหอผู้ป่วย



บริเวณรอเยี่ยมด้านหน้าหอผู้ป่วย



ระเบียงพักผ่อน



ห้องให้คำปรึกษา



ห้องแยกผู้ป่วย



ภายในหอผู้ป่วย

### ผลงานของพวกเรา

1. ได้รับการไว้วางใจจากผู้รับบริการ มีระดับความพึงพอใจ 94.25% ปี พ.ศ. 2556
2. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยวิกฤตร่วมกับการพยาบาลทางเลือกในกลุ่มผู้ป่วย Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) และ Tetanus ผลลัพธ์ ผู้ป่วยหายเครื่องช่วยหายใจได้เร็วขึ้น ใช้เครื่องช่วยหายใจลดลง วันนอนลดลง
3. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP) < 5 ต่อ 1,000 วันใส่ท่อช่วยหายใจ
4. อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 25.25% (กลุ่มที่มี Apache II score < 25/อัตราการเสียชีวิต 5.9%)
5. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย septic shock ลดลงจาก 51.29% (ปี พ.ศ. 2554) 36.96% (ปี พ.ศ. 2555) และ 36.1% (ปี พ.ศ. 2556)