

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระนวน

ทิพย์วรรณ ทำนา¹

บทคัดย่อ

การวิจัยภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระยะเวลา ปัจจัยที่สัมพันธ์ และ ปัจจัยทำนายระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย 120 ราย ที่มารับการรักษาระหว่าง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ไคสแควร์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยโลจิสติกพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 62.50 ของผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลภายใน 270 นาที สถานภาพสมรสเป็น ปัจจัยส่วนบุคคลเดียวที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการมารับการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.001$) การรับรู้ความรุนแรงของโรคและการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีความสัมพันธ์ทาง ลบกับระยะเวลามารับการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยทำนาย ระยะเวลาการมารับการรักษาด้วยสถิติถดถอยโลจิสติกพหุคูณ พบว่าโมเดลสามารถทำนายระยะเวลา การมารับการรักษาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$, Nagelkerke $R^2 = 0.49$) โดยคะแนนรวม การรับรู้ความรุนแรงของโรคเป็นปัจจัยทำนายเดียวที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) ผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่าการส่งเสริมการรับรู้ความรุนแรงของโรคควบคู่กับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จะช่วย ลดระยะเวลาการมารับการรักษาและความพิการจากโรคหลอดเลือดสมองได้

คำสำคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง, การรับรู้ความรุนแรงของโรค, การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

¹ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น

*Corresponding Author; Tippawan Thamna, Email:Liwtip1992@gmail.com

Received: August 05, 2026; Revised October 07, 2026; Accepted October 07, 2026

Factors Related to Hospital Arrival Time of Acute Stroke Patients in Kranuan Crown Prince Hospital

Tippawan Thamna¹

Abstract

This cross-sectional study examined onset-to-arrival time, associated factors, and predictors among 120 acute stroke patients at Kranuan Crown Prince Hospital (September 2025-February 2026). Data were collected via questionnaire and analyzed using descriptive statistics, chi-square test, Pearson's correlation, and multiple logistic regression. Overall, 62.50% of patients arrived within 270 minutes (mean=615.54, SD=966.99). Marital status was the only personal factor significantly associated with arrival time ($p = 0.001$). Perceived stroke severity and EMS accessibility were negatively correlated with arrival time ($p < 0.001$). When analyzing the predictors of time to hospital arrival using multiple logistic regression, the model could significantly predict the time ($p < 0.001$, Nagelkerke $R^2 = 0.49$), with the total score of perceived severity of stroke being the only statistically significant predictor ($p < 0.001$). The findings suggest that promoting the perception of stroke severity along with improving the emergency medical system could reduce the time to treatment and disability from stroke.

Keywords: stroke, perceived severity of stroke, accessibility to emergency medical services

¹Medical Physical Senior Level, Kranuan Crown Prince Hospital

บทนำ (Introduction)

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายและความพิการอันดับต้นๆทั่วโลก¹ การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังเกิดอาการช่วยลดความพิการและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย² ดังนั้นระยะเวลาที่ผู้ป่วยมาได้รับการรักษาหลังเกิดอาการจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันเวลาที่ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าความล่าช้าในการมารับการรักษาของผู้ป่วย ยังคงเป็นปัญหาสำคัญทั่วโลก ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการมารับการรักษา ได้แก่ ระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาล การศึกษาระดับต่ำ โรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ในขณะที่การรับรู้ความรุนแรงของอาการ ความเข้าใจเรื่องการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดและการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสัมพันธ์กับการมารับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น³ สำหรับประเทศไทยการศึกษาของ Chaioy⁴ ในจังหวัดขอนแก่น พบว่าปัจจัยทำนายระยะเวลามารับการรักษา ได้แก่ ระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาล ระดับความรุนแรงของโรค ประวัติโรคหลอดเลือดสมองและอาชีพการศึกษาของ Khamsareeruk และ Jitpanya⁵ ที่โรงพยาบาลชลบุรี พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการมารับการรักษา ได้แก่ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ประเภทสิทธิการรักษาการรับรู้ความรุนแรงของโรคและการรับรู้อุปสรรคการเข้าถึงบริการ การศึกษาของ จิณฐิตา คาสารักษ์⁶ ที่โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ พบว่าการรับรู้ความรุนแรงของโรคและความสำคัญของอาการมีความสัมพันธ์ทางลบกับระยะเวลาการมาโรงพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้การศึกษาของ Saengsuwan และคณะ⁷ ในกลุ่มผู้ป่วยไทยที่มีความเสี่ยงสูง (เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือ TIA ซ้ำ) พบว่าความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงและอาการเตือนของโรคยังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจและการศึกษาของ Muengtawepongsa และคณะ⁸ พบว่าแม้ผู้ป่วยไทยจะมีความรู้เรื่องอาการเตือนของโรคเพียงพอแต่การรับรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องรีบไปรับการรักษาทันทียังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความล่าช้าในการมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนเป็นแม่ข่ายรับส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวนมากในแต่ละปีแต่มีผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดเพียงส่วนน้อยเนื่องจากมาถึงโรงพยาบาลล่าช้า ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะเวลาการมารับการรักษาเพื่อนำไปพัฒนาระบบการดูแลตั้งแต่ระยะแรก โดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของ Rosenstock⁹ และ Becker¹⁰ ร่วมกับกรอบแนวคิดการแสวงหาบริการสุขภาพของ Andersen และ Newman¹¹ และแนวคิดมิติการเข้าถึงบริการสุขภาพของ Panchansky และ Thomas¹² ในการกำหนดตัวแปรต้น 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรค และการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อศึกษาระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรค การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรค และการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กับระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis)

1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

2. ปัจจัยการรับรู้ความรุนแรงของโรค การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรค และการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสามารถร่วมกันทำนายระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันได้

วิธีดำเนินงานวิจัย (Methodology)

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ (Cross-sectional

analytic study) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria)

อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันชนิดขาดเลือด มีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจนมาถึงห้องฉุกเฉินไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีผลตรวจทางรังสีวินิจฉัยสอดคล้องกับการวินิจฉัย และยินยอมเข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ

เกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria)

ผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน มีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร มีโรคร่วมที่ส่งผลต่อการรับรู้ หรือปฏิเสธเข้าร่วมวิจัย

คำนวณขนาดตัวอย่าง

โดยใช้โปรแกรม G*Power ที่ระดับอำนาจการทดสอบ 0.80, ระดับนัยสำคัญ 0.05, ขนาดอิทธิพลปานกลาง 0.30 และ $df = 7$ ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 107 ราย เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ผู้วิจัยได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 120 ราย โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้าทุกรายที่เข้ารับบริการในช่วงเวลาที่กำหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 10 ข้อ 2) การรับรู้ความรุนแรงของโรค 12 ข้อ 3) การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและ 4) การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 10 ข้อ โดยคะแนนมากแสดงถึงการรับรู้ความรุนแรงสูงและการเข้าถึงบริการได้ดี

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.91 ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 1.00 จากนั้นนำไปทดลองกับกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 ราย ได้ค่า Cronbach's alpha เท่ากับ 0.89

การเก็บรวบรวมข้อมูล

หลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยแล้วผู้วิจัยแนะนำตัวชี้แจงวัตถุประสงค์ขอความร่วมมือและให้ลงนามในเอกสารยินยอมจากนั้นให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง หรือสัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือญาติกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตอบได้

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระยะเวลาการมารับการรักษาด้วย Chi-square test วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรค การได้รับข้อมูล และการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กับระยะเวลาการมารับการรักษาด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์ปัจจัยทำนายระยะเวลาการมารับการรักษาด้วยการถดถอยโลจิสติกพหุคูณ โดยนำคะแนนรวมของตัวแปรต้นทั้ง 3 ด้านเข้าสมการ กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เลขที่ REC043/2568 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2568

ผลการวิจัย (Result)

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันจำนวน 120 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 61.70 อายุเฉลี่ย 62.75 ปี (S.D. = 13.36) มีสถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 83.30 ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ 50.00 และมีโรคประจำตัวที่พบบ่อยที่สุดคือความดันโลหิตสูงร้อยละ 43.30 กลุ่มตัวอย่างมารับการรักษาภายในเวลา 270 นาที ร้อยละ 62.50 โดยระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 615.54 นาที (S.D. = 966.99) รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและระยะเวลาการมารับการรักษาของกลุ่มตัวอย่าง (n = 120)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เพศ		
ชาย	74	61.70
หญิง	46	38.30
2. อายุ (ปี)		
< 40	4	3.30
40-59	45	37.50
≥ 60	71	59.20
Mean ± SD. : 62.75 ± 13.36 ปี		
Median (Min.- Max.) : 64.50 (32.00-92.00) ปี		
3. ระดับการศึกษา		
ไม่ได้เรียน	9	7.50
ประถมศึกษา	56	46.70
มัธยมศึกษา/ปวช.	27	22.50
อนุปริญญา/ปวส.	13	10.50
ปริญญาตรีขึ้นไป	15	12.50
4. สถานภาพสมรส		
โสด	17	14.20
คู่	100	83.30
หม้าย/หย่า/แยก	3	2.50
5. อาชีพ		
ไม่ได้ทำงาน	29	24.20
เกษตรกรรม	60	50.00
รับจ้าง	12	10.00
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	10	8.30
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	8	6.70
6. ศาสนา		
พุทธ	120	100.00

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและระยะเวลาการมารับการรักษาของกลุ่มตัวอย่าง (n = 120) (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
7. รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน (บาท)		
5,001-10,000	29	24.20
10,001-20,000	69	57.50
> 20,000	22	18.30
8. ประวัติโรคประจำตัว*		
ความดันโลหิตสูง	52	43.30
เบาหวาน	36	30.00
ไขมันในเลือดสูง	33	37.50
โรคหัวใจ	12	10.00
อื่นๆ ระบุ...	18	15.00
ไม่มีโรคประจำตัว	54	45.00
(*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
9. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจนมาถึงโรงพยาบาล		
≤270 นาที	75	62.50
> 270 นาที	45	37.50
Mean ± SD. : 615.54 ± 966.99 นาที		
Median (Min.- Max.) : 180.00 (10.00-4320.00) นาที		

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับระยะเวลาการมารับการ
รักษาด้วยสถิติ Chi-square test พบว่า
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับระยะเวลา
การมารับการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
($\chi^2 = 14.11$, $p = 0.001$) โดยกลุ่มที่มี

สถานภาพโสดมีส่วนการมารับการรักษา
ล่าช้าสูงกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพคู่ ส่วนเพศ
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p >$
0.05) รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระยะเวลาการมารับการรักษา (n = 120)

ปัจจัยส่วนบุคคล	ระยะเวลา การมารับ การรักษา		OR	95%CI	χ^2	p- value
	≤ 270 นาที	ระยะเวลา การมารับ การรักษา > 270 นาที				
	(n=75)	(n=45)				
1. เพศ			0.89	0.38 ถึง 2.12	1.59	0.208
ชาย	43	31				
หญิง	32	14				
2. อายุ (ปี)			0.74	0.34 ถึง 1.63	1.11	0.574
< 40	2	2				
40-59	26	19				
≥ 60	47	24				
ค่าเฉลี่ย 62.75, S.D. = 13.36						
3. ระดับการศึกษา			1.01	0.61 ถึง 1.66	5.45	0.244
ไม่ได้เรียน	7	2				
ประถมศึกษา	38	18				
มัธยมศึกษา/ปวช.	12	15				
อนุปริญญา/ปวส.	8	5				
ปริญญาตรีขึ้นไป	10	5				
4. สถานภาพสมรส			0.14	0.04 ถึง 0.51	14.11	0.001*
โสด	4	13				
คู่	68	32				
หม้าย/หย่า/แยก	3	0				
5. รายได้เฉลี่ย ครอบครัวต่อเดือน (บาท)			0.71	0.35 ถึง 1.46	3.44	0.179
5,001-10,000	14	15				
10,001-20,000	47	22				
> 20,000	14	8				

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระยะเวลาการมารับการรักษา (n = 120) (ต่อ)

ปัจจัยส่วนบุคคล	ระยะเวลา การมารับ การรักษา	ระยะเวลา การมารับ การรักษา	OR	95%CI	χ^2	p- value
	≤ 270 นาที	> 270 นาที				
	(n=75)	(n=45)				
6. อาชีพ			1.04	0.68 ถึง 1.57	1.06	0.901
ไม่ได้ทำงาน	18	11				
เกษตรกรกรรม	39	21				
รับจ้าง	6	6				
ค้าขาย/ธุรกิจ	6	4				
ส่วนตัว						
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ	6	3				

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความรุนแรงของโรคโดยรวมอยู่ในระดับสูง (mean = 4.15, S.D. = 0.77) และมีการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (mean = 3.51, S.D. = 0.61) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับระยะเวลาการมารับการรักษาด้วยสถิติสหสัมพันธ์สเปียร์แมน พบว่าทั้งการรับรู้ความรุนแรง

ของโรค การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรค และการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีความสัมพันธ์ทางลบกับระยะเวลาการมารับการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกตัวแปร ($p < 0.001$) โดยการรับรู้ความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธ์สูงสุด ($r = -0.45$) รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ด้านกับระยะเวลาการมารับการรักษา (n = 120)

ตัวแปร	Mean $\pm$ S.D.	r กับระยะเวลา มารับการรักษา	p-value
การรับรู้ความรุนแรงของโรค (1-5)	4.15 $\pm$ 0.77	-0.45	<0.001
การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรค (0-6)	2.48 $\pm$ 1.70	-0.32	<0.001
การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (1-5)	3.51 $\pm$ 0.61	-0.35	<0.001

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกพบว่าคุณสมบัติโดยรวมสามารถทำนายระยะเวลาการมารับการรักษาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Omnibus $\chi^2 = 53.48$, $df = 3$, $p < 0.001$) โดยมีค่า Nagelkerke $R^2 = 0.49$ และสามารถจำแนกกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 80.00 เมื่อพิจารณา รายตัวแปรพบว่าการรับรู้ความรุนแรงของโรค เป็นปัจจัยทำนายเดียวที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ในการลดโอกาสการมารับการรักษาล่าช้า (B

$= -1.92$, $p < 0.001$, $\text{Exp}(B) = 0.15$, 95%CI $= 0.06-0.35$) ขณะที่การเข้าถึงระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินและการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.076$ และ $p = 0.840$ ตามลำดับ) ทั้งนี้สามารถเขียนสมการทำนายโอกาสการมารับการรักษาได้ ดังนี้ $\text{Logit}(P) = 10.283 - 1.923$ (การรับรู้ความรุนแรงของโรค) $+ 0.036$ (การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรค) $- 0.897$ (การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน)

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกพหุคูณของปัจจัยทำนายระยะเวลาการมารับการรักษา ($n = 120$)

ปัจจัย	B	S.E.	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for Exp(B)
การรับรู้ความรุนแรงของโรค*	-1.92	0.44	<0.001	0.15	0.06 ถึง 0.35
การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรค	0.04	0.18	0.840	1.04	0.73 ถึง 1.48
การเข้าถึง EMS	-0.90	0.51	0.076	0.41	0.15 ถึง 1.10

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | Omnibus $\chi^2 = 53.48$, $df = 3$, $p < 0.001$ | Nagelkerke $R^2 = 0.49$ | จำแนกกลุ่มถูกต้องร้อยละ 80.00

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมารับการรักษาภายในเวลา 270 นาทีร้อยละ 62.50 และมีความแปรปรวนของระยะเวลาการมารับการรักษาสูงมาก สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอและเป็นแม่ข่ายรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในเครือข่าย ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบขนาดใหญ่ ประกอบด้วยอำเภอกระนวน อำเภอท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี

และอำเภอห้วยเม็ก ผู้ป่วยบางส่วนต้องเดินทางระยะไกลอันเป็นข้อจำกัดด้านการเข้าถึงเชิงภูมิศาสตร์ตามแนวคิดมิติการเข้าถึงบริการสุขภาพของ Penchansky และ Thomas¹² เมื่อเทียบกับการศึกษาของ Sangkaew และคณะ¹³ ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตเมืองที่พบว่าปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการมีอำนาจการทำนายสูงสุด สะท้อนว่าปัญหาการเดินทางและการเข้าถึงบริการมีบทบาทสำคัญในบริบทโรงพยาบาลในชนบทเช่นกัน

ด้านปัจจัยส่วนบุคคลพบว่ามีเพียงสถานภาพสมรสที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการมารับการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอธิบายได้ด้วยแนวคิดปัจจัยสนับสนุน (Enabling factors) ของ Andersen และ Newman¹¹ กล่าวคือ ผู้ป่วยที่มีคู่สมรสก็มีบุคคลใกล้ชิดที่สังเกตเห็นความผิดปกติและช่วยตัดสินใจนำส่งโรงพยาบาลได้รวดเร็วกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสดหรืออยู่คนเดียว ผลการศึกษาแตกต่างจากการศึกษาของ Chaiyo⁴ ที่พบว่าอาชีพเป็นปัจจัยสำคัญ และ Khamsareeruk และ Jitpanya⁵ ที่พบว่าระดับการศึกษาและรายได้มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการมารับการรักษา ความแตกต่างนี้อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งด้านอาชีพและรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและมีรายได้ในช่วงเดียวกัน ทำให้ความแปรปรวนของปัจจัยเหล่านี้มีน้อยสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรค การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรค และการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กับระยะเวลาการมารับการรักษา พบว่ามีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกตัวแปร สอดคล้องกับการศึกษาของจิณัฐตา ศาสตราภิรักษ์⁶ ที่พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของอาการมีความสัมพันธ์ทางลบกับระยะเวลามาโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยโลจิสติกพหุคูณ พบว่าคะแนนรวมการรับรู้ความรุนแรงของโรคเป็นตัวแปร

ทำนายเดียวที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของ Rosenstock⁹ และ Becker¹⁰ ที่ระบุว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรคเป็นองค์ประกอบหลักที่ผลักดันพฤติกรรมสุขภาพ ส่วนคะแนนเฉลี่ยการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน แต่ไม่ถึงระดับนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งยังสอดคล้องในทิศทางกับการศึกษาของ Sukpongthai และ Borisat¹⁴ ที่พบว่า การรู้จักใช้เบอร์ฉุกเฉิน 1669 สัมพันธ์กับการมาโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น การศึกษาของ Wu และคณะ¹⁵ ในประเทศจีนพบว่า การมาโรงพยาบาลโดยรถพยาบาลฉุกเฉินและระยะทางที่ใกล้สัมพันธ์กับการมาถึงโรงพยาบาลได้เร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การศึกษาของ Han และคณะ¹⁶ ในประเทศเกาหลีใต้พบว่าพฤติกรรมการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นปัจจัยทำนายที่สำคัญเช่นกัน ในขณะที่คะแนนรวมการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในการทำนายเมื่อควบคุมตัวแปรอื่น อาจเนื่องจากแบบสอบถามวัดเพียงจำนวนแหล่งข้อมูลที่ผู้ป่วยเคยได้รับแต่ไม่ได้วัดความเข้าใจหรือความสามารถในการนำไปใช้ได้จริงซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Muengtawepongse และคณะ⁷ ที่พบว่าความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดพฤติกรรมมารับการรักษาอย่างทันท่วงทีหากผู้ป่วยไม่รับรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องรับมาการรักษา

โดยสรุปผลการวิจัยนี้พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรคเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีความสัมพันธ์และสามารถทำนายระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันได้ ส่วนการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสถานภาพสมรสยังมีบทบาทสนับสนุนที่ควรพิจารณาร่วมด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดให้มีบุคลากรเชิงรุกที่เน้นย้ำความรุนแรงและผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมอง เช่น การพึ่งพาผู้อื่นและการเป็นภาระของครอบครัวมากกว่าการให้ความรู้เรื่องอาการเพียงอย่างเดียว

2. ควรจัดระบบเฝ้าระวังเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีสถานภาพโรคหรืออาศัยอยู่ตามลำพังและประชาสัมพันธ์การใช้บริการหมายเลขฉุกเฉิน 1669 อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของรพพยาบาลฉุกเฉินในพื้นที่เครือข่ายรับส่งต่อ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน แพทย์หญิงอมรรัตน์ เพ็ญเกษ อายุรแพทย์ระบบประสาท ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บุคลากรห้องฉุกเฉิน รวมถึงผู้ป่วยและญาติทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมี

ส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

1. World Health Organization. Stroke, cerebrovascular accident [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2024 [cited 2025 Jul 23]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/stroke>
2. สถาบันประสาทวิทยา. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไป (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2561.
3. Zhao Y, Xu Y, Fang S, Zhi S, Ma D, Song D, et al. Incidence and associated factors of prehospital care-seeking delay in people with acute ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis. *Neuroepidemiology*. 2025;59(6):727-42.
4. Chaiyo S. Factors predicting the visiting time in patients with acute ischemic stroke [master's thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2014.
5. Khamsareeruk J, Jitpanya C. Factors related to the duration of treatment of patients with acute ischemic stroke. *J Police Nurses*. 2019;7(2):106-19.
6. จิณัฐดา คาสารักษ์. ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับระยะเวลาการมารับการ

- รักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน [วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.
7. Saengsuwan J, Suangpho P, Tiamkao S. Knowledge of stroke risk factors and warning signs in patients with recurrent stroke or recurrent transient ischaemic attack in Thailand. *Neurol Res Int*. 2017;2017:8215726.
 8. Muengtaweepongsa S, Hungkok W, Harnirattisai T. Poor recognition of prompted treatment seeking even with good knowledge of stroke warning signs contribute to delayed arrival of acute ischemic stroke patients in Thailand. *J Stroke Cerebrovasc Dis*. 2014;23(5):948-52.
 9. Rosenstock IM. The health belief model and preventive health behavior. *Health Educ Monogr*. 1974;2(4):354-86.
 10. Becker MH. The health belief model and sick role behavior. *Health Educ Monogr*. 1974;2(4):409-19.
 11. Andersen R, Newman JF. Societal and individual determinants of medical care utilization in the United States. *Milbank Q*. 2005;83(4):1-28.
 12. Penchansky R, Thomas JW. The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction. *Med Care*. 1981;19(2):127-40.
 13. Sangkaew P, Jitpanya C, Pooprasert P. Factors related to arrival time for treatment in patients with acute stroke. *J Fac Nurs Burapha Univ*. 2021;29(3):13-24.
 14. Sukpongthai S, Borisat T. Quality of life and factors affecting hospital arrival time among stroke patients. *ASEAN J Psychiatry*. 2020;21(1):1-10.
 15. Wu X, Zhou Q, Jiang X, Fan F, Wang W, Wang J, et al. Stroke knowledge and attitudes influence early hospital arrival in acute ischemic stroke: a multicenter cross-sectional survey from Hubei Province, China. *Front Neurol*. 2025;16:1669361.
 16. Han KT, Park EC, Kim SJ, Jang SI, Shin J, Kim CO. Factors associated with hospital arrival time in patients with ischemic stroke in Korea. *J Stroke Cerebrovasc Dis*. 2022;31(2):106-12.