

Super Hemorrhoids
Medical Hemorrhoidectomy

จำรัส บัญศิริ *

สุรติ เล็กอุทัย *

เรื่องย่อ

พระภิกษุ อายุ 74 ปี เริ่มมีอาการโรคเนื้องอกริดสีดวงทวารมาตั้งแต่อายุ 19 ปี ได้รับการบำบัดรักษาด้วยยากิน ยาเหน็บ ยาทา และยาป้ายให้หัวริดสีดวงหลุด ทอนอายุได้ 36 ปี แต่แล้วก็กลับกำเริบเป็น ๆ หาย ๆ อีกเรื่อยมา จนต้องได้รับการผ่าตัด เมื่อปี 2520 และปี 2522 รวมทำผ่าตัดใหญ่อีก 2 ครั้ง

โรงพยาบาลดำเนินสะดวกได้รับไว้เป็นผู้ป่วยภายใน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2526 เนื่องจากการเสียโลหิต เลือดจางมาก Htc. 14% 11% 18% 24% ได้ให้เลือด gr.O ครั้งละ 500, 400, 300, 300 cc เป็นระยะ สลับกับน้ำเกลือ

วันที่ 4 สิงหาคม 2526 ได้สวนทวาร Unison Enema 20 cc อูจาระแข็งมากต้องใช้นิ้วล้วงช่วยควักออกจากกัน มีก้อนเนื้องอกริดสีดวงทวารโผล่มา 1 นิ้ว 1 ก้อนที่ตำแหน่ง 7.00 น. จึงฉีดยา G.P.E. 33 เข้าได้เยื่อรอบ ๆ หัวนั้นจนสีซีดขาวแข็งสูกทั่วบางแห่งก็มีสีดำคล้ำ

วันรุ่งขึ้นเกิด perianal edema และมีหัวริดสีดวงโผล่ออกมาโดยรอบอีก 4 หัวที่ตำแหน่ง

แห่ง 11.00 น., 13.00 น., 15.00 น., 17.00 น. รวมเป็น 5 หัว ใหญ่ 2 เล็ก 3 จึงฉีดยา G.P.E. 33 รวมประมาณ 20 cc ใช้เวลานาน 1.30 ชั่วโมง ผู้ป่วยทนยาได้ดี

วันที่ 15 สิงหาคม 2526 ตอนเช้าตรวจดูยังมีหัวริดสีดวงตรง 11.00 น. สีดำคล้ำยังไม่หลุดไม่หมด ตอนค่ำได้ถ่ายภาพไว้ให้เห็นเฉพาะ perianal edema ส่วนริดสีดวงอีก 5 หัว หลุดแล้วหดกลับเข้าไปหมดไม่เป็นบานทะโลกเช่นเมื่อ 10 วันก่อน

วันที่ 18 สิงหาคม 2526 Perianal edema ยุบผ่องลงมากพอลุกนั่งได้เองจึงอนุญาตให้กลับวัดได้รวมระยะเวลา 14 วัน หลังฉีดยาผสม Phenol

* นายแพทย์จำรัส บัญศิริ พ.บ.

ผู้อำนวยการพิเศษฝ่ายสุติ-นรีเวชกรรม

* นายแพทย์สุรติ เล็กอุทัย พ.บ. วุฒิบัตรศัลยศาสตร์

ฝ่ายวิภาคการ ร.พ. ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ผู้อำนวยการ นายแพทย์พนัง นิยานนท์

โรคเนื้องอกริดสีดวงทวารเป็นกันมากประมาณ 10% ของประชากรทุกอาชีพ ทุกชนชั้นวรรณะ ทั้งชนบทและในเมืองกรุงทั่วประเทศและทั่วโลก อายุ 20-70 ปี ผู้ป่วยชายมารับการรักษา มากกว่าเพศหญิง 3 : 1

ด้านบริหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็น Specific Treatment for all stages of Hemorrhoids ประหยัด (ทุน) ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างเหลือเชื่อทั้งงบประมาณของรัฐ-ราษฎร์ ประสิทธิภาพ 99% ปลอดภัยไร้กังวล เชื่อถือได้ ทำง่ายที่สุดประสิทธิภาพ 100% ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เมื่อเปิดบริการคลินิกฮีมอรอยด์ที่แผนกผู้ป่วยนอก ตามศูนย์บริการสาธารณสุขของรัฐ เหมาะสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (G.P.) ทางโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจึงขอเสนอแนะวิธีการใช้ยาฉีดผสมฟีนอลรักษาโรคริดสีดวงทวาร ซึ่งทำได้ผล 99% เท่ากับการผ่าตัดใหญ่

วิธีดำเนินงานวิจัย Extravascular injection treatment

G.P.E 33 (Glycerine, Phenol. Ergot Extract 33% by volume) is the drug of choice for treatment of Supper Hemorrhoids or complicated Hemorrhoids.

Injection of the sclerosant is suitable for first and second degree

hemorrhoid. The hemorrhoid must be displayed through a proctoscope in an empty rectum. Using a Gabriel's syringe, 3 to 5 ml. of G.P.E. 33 is injected into the submucosa immediately above each hemorrhoid. Elevation and pallor of the overlying mucosa can be seen. The sclerosant spreads in the submucosa, causing aseptic gangrene, necrosis, scarring and fixation of the hemorrhoid. The healing process is approximately 10 days. Repeated injection at monthly intervals may not be required.

The procedure is also suitable for more substantial or permanently prolapsed hemorrhoids, when used appropriately is extremely safe, effective and well tolerated. The only complications reported have resulted from incorrectly placed injections.



แบค

ภาวะ

การ

ACE

โครง

รัง

TRA

COL