

๓. การจำแนกความรุนแรงของโรคพิษแห่งครรภ์

การจำแนกพิถีพิถันความรุนแรงของโรคพิษแห่งครรภ์ว่าอยู่ใน ขั้นรุนแรง, ขั้นปานกลาง หรือ ขั้นเบา นั้นในบางครั้งเป็นการยาก. วิทท์ลินเกอร์ (ค.ศ. ๑๙๖๕) เสนอระบบการให้คะแนนตามรายการข้อมูลต่าง ๆ ของโรคโดยเริ่มให้คะแนนจาก ๐-๘. เมื่อรวมคะแนนแล้วจึงนำไปเทียบผลจำแนกออกเป็นชั้นต่าง ๆ, ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวสำหรับการพยากรณ์โรคของแม่และลูกได้ด้วย. ผู้เขียนได้คัดแปลงวิธีการให้คะแนนตามความเหมาะสมต่อผู้ป่วยในบ้านของเรา ดังรายการต่อไปนี้:—

<u>ข้อมูล</u>	<u>คะแนน</u>
๑) <u>บวม</u>	
ไม่ปรากฏ	๐
เฉพาะแห่ง	๒
ทั้งตัว	๔
๒) <u>น้ำหนักตัวเพิ่มต่อหนึ่งสัปดาห์</u>	
จากเดิม — ๑ กิโลกรัม	๐
> ๑ — ๒ กิโลกรัม	๒
> ๒ กิโลกรัม	๔
๓) <u>ไข่ขาวในปัสสาวะใน ๒๔ ชั่วโมง</u>	
ไม่ปรากฏ — ๐.๕ กรัม	๐
๐.๖ — ๑ กรัม	๒
๑.๑ — ๓ กรัม	๔
> ๓ กรัมขึ้นไป	๖
๔) <u>แรงดันเลือด (๒ ครั้งหลังจากนอนพักแล้ว)</u>	
เพิ่มจากเดิมไม่เกิน ๓๐/๑๕	๐
> ๓๐/๑๕ — ๕๕/๒๕	๒

๖๐/๓๐ — ๘๘/๕๘	๔
๕๐/๖๐ ขึ้นไป	๖
๕) ปริมาณบัสสาวะใน ๒๔ ชั่วโมง	
> ๑๐๐๐ มล.	๐
๔๐๐ — ๑๐๐๐ มล.	๒
< ๔๐๐ มล.	๔
ไม่มีขี้สวาระนานเกิน ๖ ชั่วโมง	๘
๖) อาการต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ, ตามัว ๆ ล ๆ	
ไม่ปรากฏ	๐
ปรากฏ	๔
๗) การชัก	
หลังชักแต่ละครั้งแล้วรู้สึกตัว	๒
ชักแล้วไม่รู้สึกตัว	๔
ชักเกิน ๑๐ ครั้ง	๘

การแปลผล:

คะแนน	พิกัดรุนแรงของโรค	พยากรณ์โรค
๐ — ๑๐	ขั้นเบา	ดีทั้งแม่และลูก
๑๑ — ๒๐	ขั้นปานกลาง	ขึ้นอยู่กับการรักษา
๒๑ ขึ้นไป	ขั้นรุนแรง	เลว (อาจถึงเสียชีวิตทั้งแม่และลูก)

(จาก Wittlinger : Ob-Gyn. Observer 1969, 8 : 7.)

เสียบยง ศิริวรรณบุรณ์ พ.บ., M.S. Ob. Gyn.
(ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา)